

Zasady pobierania, przechowywania i transportu próbki kału do badań w kierunku rotawirusów, adenowirusów, astrowirusów i norowirusów

Próbkę należy pobrać jak najszybciej po wystąpieniu objawów choroby (biegunki), możliwie przed podaniem leków przeciwwirusowych. Przy nawracającej bieguncie próbkę należy pobrać w okresie nawrotu choroby.

Nie należy pobierać kału z toalety. Nie należy zanieczyszczać próbki moczem, mydłem, środkami dezynfekcyjnymi.

I. Pobieranie próbki kału:

- Kał należy oddać do dokładnie umytego, wyparzonego wrzątkiem i wysuszonego naczynia (np. basenu, nocnika) lub naczynia jednorazowego użycia (np. talerza).
Od noworodków i niemowląt kał należy pobierać z pieluchy natychmiast po defekacji.
- Ze świeżo oddanego kału, łopatką przytwierdzoną do pokrywki specjalnego sterylnego pojemnika (tzw. „kałówki”), należy pobrać grudkę wielkości wiśni lub 1-2 ml płynnego kału.
- Pojemnik z pobranym kałem należy opisać **imieniem i nazwiskiem** osoby badanej, oraz **datą i godziną** pobrania materiału. Pojemnik należy włożyć do foliowego woreczka, woreczek zawiązać.

II. Przechowywanie i transport materiału do laboratorium:

- Próbkę kału należy dostarczyć do laboratorium **w ciągu 2 godzin od pobrania**, w temperaturze otoczenia.
Jeśli nie jest to możliwe, próbkę należy przechowywać w temperaturze **od +2°C do +8°C i maksymalnie do 48 godzin od chwili pobrania** przekazać do laboratorium. Zaleca się transport próbki w stanie schłodzonym (np. w styropianowym pojemniku lub torbie izotermicznej z wkładem chłodzącym).
- Do próbki należy dołączyć **dokładnie i czytelnie** wypełnione „Zlecenie na badanie laboratoryjne w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych” - F/I/PO/OL/LMiP-04-04-01.

Formularz zlecenia dostępny jest w Punkcie przyjmowania próbek do badań diagnostycznych od pacjentów oraz na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze.