

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY
DZIAŁ LABORATORYJNY
ODDZIAŁ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ

Wyciąg z załącznika nr 5 do PL-02/IR-01/LLD wydanie 1 załącznika z dnia 2023-02-27

3.5. Pobieranie i transport wymazów z nosogardzieli w kierunku grypy typu A, typu B i wirusa oddechowego RSV

Konieczność natychmiastowego skontaktowania się z Oddziałem Diagnostyki Medycznej w WSSE w Bydgoszczy: telefon 52 37 618 87 lub z telefonem alarmowym: 604 52 64 22.

Konieczność podania telefonu lekarza prowadzącego!

Materiał pobierać w ostrym okresie choroby (nie później niż 5-go dnia od wystąpienia pierwszych symptomów choroby) od pacjentów mających co najmniej jeden z objawów:

- ze strony układu oddechowego: kaszel, ból gardła, nieżyt nosa
- ogólnoustrojowych: nagłe wystąpienie choroby, gorączka powyżej 38oC, pocenie się, dreszcze, bóle mięśni/stawów, ból głowy, uczucie wyczerpania/zmęczenia/rozbicia, nudności.

Procedura pobrania wymazu do badań z użyciem komercyjnych zestawów:

1. Założyć rękawiczki.
2. Nakleić dołączony do zestawu kod kreskowy na probówkę (wzdłuż probówki).
3. **Wymaz z gardła:**
 - Rozpakować pałeczkę wymazową.
 - Używając szpatułki docisnąć język ku dołowi, co pozwoli uniknąć kontaminacji wymazu śliną.
 - Pobrać wymaz z gardła (preferowany wymaz z głębokiego gardła) – pocierać tylną ścianę gardła, nie dotykając wymazówką powierzchni jamy ustnej i języka. Wymaz należy pobierać z miejsc zmienionych zapalnie.
 - Po pobraniu otworzyć probówkę, umieścić wacik w górnej części probówki i odłamać, pozostawiając wacik wewnątrz probówki.
 - Szczelnie zamknąć korkiem i strząsnąć probówkę.
 - Wyrzucić bagietkę pałeczki.

4. Wymaz z nosa – z każdego nozdrza.

Wymaz należy pobrać przed wydmuchaniem nosa:

- Rozpakować pałeczkę wymazową.
- Pobrać wymaz z nozdrzy. Wymaz powinien być pobierany energicznie, aby mieć pewność, iż zawiera on komórki i śluz z wnętrza nozdrza.

- Po pobraniu otworzyć probówkę, umieścić wacik w górnej części probówki i odłamać, pozostawiając wacik wewnątrz probówki. W jednej probówce znajdują się 2 wymazy (z gardła i z nosa).
 - Szczelnie zamknąć korkiem i strząsnąć probówkę.
 - Wyrzucić bagietkę pałeczki.
5. Zdezynfekować powierzchnię probówki przed umieszczeniem jej w woreczku strunowym.
 6. Umieścić zdezynfekowaną probówkę w woreczku strunowym.
 7. Woreczek strunowy zawierający probówkę umieścić w kopercie bezpiecznej.
 8. Zakleić kopertę bezpieczną.
 9. Nakleić dołączone do zestawu kody kreskowe na: kopertę bezpieczną, kopertę foliową z oznaczeniem „Biohazard” oraz na zlecenie na badania.
 10. Umieścić kopertę bezpieczną we wnętrzu koperty foliowej, zakleić kopertę foliową.
 11. Umieścić dokumentację pacjenta w kieszonce koperty foliowej.
 12. Kopertę bezpieczną zawierającą probówkę w kopercie foliowej oraz dokumentację pacjenta umieścić w opakowaniu zbiorczym, które należy opisać słowem „SENTINEL”.
 13. Probówkę do czasu transportu przechowywać w temperaturze 2-8 °C.

UWAGA! Materiał pobierać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i środków ochrony indywidualnej (rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, gogle). W przypadku pacjentów hospitalizowanych z długotrwałą infekcją dolnych dróg oddechowych należy pobierać popłuczyny z pnia oskrzelowego (BAL) do jałowego pojemnika. Z materiałem należy przesłać dokładnie wypełnione dane pacjenta na formularzu – Nadzór nad Grypą (SENTINEL) i/lub na zleceniu WSSE (nazwisko i imię pacjenta, adres, PESEL, data i godzina pobrania materiału, okres choroby – czas wystąpienia objawów, przyjmowane leki).