



Znak sprawy: DHR.rs1.8200.17.2024

ZEZWOLENIE nr R-55/2025

Na podstawie art. 41 w związku z art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009¹ (dalej jako: rozporządzenie nr 1107/2009) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o środkach ochrony roślin² (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 lipca 2024 r. wraz z korektą z dnia 25 października 2024 r. złożonego przez spółkę SEIPASA S.A., C/Almudévar 2, 22240 Tardienta, (Huesca), Królestwo Hiszpanii, zgodnie z art. 40 i art. 47 rozporządzenia nr 1107/2009 oraz wniosku z dnia 27 stycznia 2025 r. wraz z korektą z dnia 29 stycznia 2025 r. złożonego zgodnie z art. 51 rozporządzenia nr 1107/2009.

ZEZWALAM

na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin **Fungisei**

DANE IDENTYFIKUJĄCE ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN:

Posiadacz zezwolenia:	SEIPASA S.A., C/Almudévar 2, 22240 Tardienta (Huesca), Królestwo Hiszpanii
Producent środka ochrony roślin:	SEIPASA S.A., C/Almudévar 2, 22240 Tardienta (Huesca), Królestwo Hiszpanii
Rodzaj środka ochrony roślin:	fungicyd
Kategoria użytkowników środka	użytkownicy profesjonalni

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/WE i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.)

² Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2024 r. poz. 630 t.j.)

ochrony roślin:	
Substancja czynna:	<i>Bacillus subtilis</i> szczep IAB/BS03 10 g/l (substancja z grupy biologicznych fungicydów) – 0,81 % * *minimalne stężenie 1 x 10 ⁸ jtk/ml
Państwo członkowskie odniesienia, z którego następuje wzajemne uznanie zezwolenia:	Republika Francuska
Numer zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin w państwie członkowskim odniesienia, wraz z datą jego wydania:	2220430 z dnia 16 maja 2022 r.
Nazwa handlowa środka ochrony roślin, wprowadzanego do obrotu w państwie członkowskim odniesienia:	Fungisei
Okres ważności środka ochrony roślin:	2 lata
Środek ochrony roślin niskiego ryzyka	tak

WARUNKI WPROWADZANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN DO OBROTU

Środek ochrony roślin należy zaopatrzyć w etykietę środka, przygotowaną przez posiadacza zezwolenia zgodnie z warunkami niniejszego zezwolenia.

Pojemność opakowania i materiał z którego wykonane jest opakowanie w którym środek może być wprowadzany do obrotu:

Pojemność opakowania:	Materiał:
500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l	HDPE

Termin ważności zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin oraz termin na zużycie istniejących zapasów, tj. sprzedaż i dystrybucję środka wprowadzonego do obrotu, a także unieszkodliwianie, przechowywanie i stosowanie środka upływa z dniem 20 października 2035 r.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ETYKIETOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Etykieta zawiera informacje wskazane w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 547/2011³, zgodnie z załącznikami do niniejszego zezwolenia.

Oznakowanie środka ochrony roślin należy zamieścić w widocznej części etykiety zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008⁴.

Etykieta środka ochrony roślin zawiera numer oraz datę wydania zezwolenia.

Posiadacz zezwolenia odpowiada za ostateczną treść i zgodność etykiety z zezwoleniem.

OBOWIĄZKI POSIADACZA ZEZWOLENIA

Zgodnie z art. 56 rozporządzenia nr 1107/2009 posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszelkich nowych informacji i danych w zakresie niezgodności środka ochrony roślin z warunkami niniejszego zezwolenia.

Zgodnie z art. 67 rozporządzenia nr 1107/2009 posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do przedkładania Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego informacji na temat wielkości sprzedaży środka w terminie wskazanym w Programie badań statystycznych statystyki publicznej. Brak przedłożenia powyższych danych w tym terminie na podstawie art. 44 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1107/2009 skutkuje wszczęciem postępowania w sprawie wycofania zezwolenia.

ZAŁĄCZNIKI DO ZEZWOLENIA

Załącznik nr 1 - Klasyfikacja i oznakowania środka ochrony roślin.

Załącznik nr 2 - Opis działania oraz warunki stosowania środka ochrony roślin.

Załącznik nr 3 - Środki ostrożności oraz szczególne warunki stosowania.

Załącznik nr 4 - Okresy karencji.

Załącznik nr 5 - Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych.

Załącznik nr 6 - Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego.

Załącznik nr 7 - Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania oraz pierwsza pomoc.

³ Rozporządzenie komisji (UE) NR 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 155 z 11.6.2011, str. 176)

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.)

Załącznik nr 8 - Pozostałe informacje dotyczące środka ochrony roślin.

Załącznik nr 9 - Zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin.

Załącznik nr 1 - KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Klasy i kategorie zagrożenia wraz ze zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:

Środek ochrony roślin nie został zaklasyfikowany do żadnej z klas i kategorii zagrożenia.

Oznakowanie środka ochrony roślin:

Wymagane piktogramy: brak.

Hasło ostrzegawcze: brak.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: brak.

Dodatkowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Brak

Zawiera szczep *Bacillus subtilis* IAB/BS03. Mikroorganizmy mogą powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Załącznik nr 2 – OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

OPIS DZIAŁANIA

FUNGICYD biologiczny w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC) przeznaczony do stosowania zapobiegawczego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Środek ochrony roślin niskiego ryzyka.

Substancją czynną środka jest bakteria *Bacillus subtilis* (szczep IAB/BS03), która wg klasyfikacji FRAC należy do grupy BM02.

Substancja czynna środka działa na patogeny roślin pośrednio poprzez konkutowanie o przestrzeń i składniki pokarmowe oraz indukowanie mechanizmów obronnych rośliny, a także bezpośrednio poprzez wytwarzanie i wydzielanie lipopeptydów o działaniu fungistatycznym i fungicydowym.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy szklarniowych lub opryskiwaczy ręcznych.

Pomidor, bakłażan (w uprawie w szklarni i w uprawie pod osłonami)

szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha (1,4 l/10 000 m² ściany liści – LWA).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-3,0 l/ha (0,6 – 1,4 l/10 000 m² ściany liści – LWA).

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy pierwszego kwiatostanu (otwarty pierwszy kwiat na pędzie głównym) do fazy pełnej dojrzałości: owoce mają typową barwę (BBCH 61-89).

Liczba zabiegów: 5

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tej uprawie).

Papryka (w uprawie w szklarni i w uprawie pod osłonami)

szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha (2,2 l/10 000 m² ściany liści – LWA).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-3,0 l/ha (0,9– 2,2 l/10 000 m² ściany liści – LWA).

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy pierwszego kwiatostanu (otwarty pierwszy kwiat) do fazy pełnej dojrzałości: owoce mają typową barwę (BBCH 61-89).

Liczba zabiegów: 5

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 700-1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tej uprawie).

Ogórek, dynia zwyczajna typ użytkowy: cukinia, kabaczek, patison (w uprawie w szklarni i w uprawie pod osłonami)

mączniak prawdziwy dyniowatych

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha (1,6 l/10 000 m² ściany liści – LWA).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-3,0 l/ha (0,5 – 1,6 l/10 000 m² ściany liści – LWA)

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości: owoce mają typową barwę (BBCH 12-89).

Liczba zabiegów: 5

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5

Melon, arbuz, dynia makaronowa, dynia olbrzymia, dynia piżmowa, dynia zwyczajna (w uprawie w szklarni i w uprawie pod osłonami)

mączniak prawdziwy dyniowatych

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha (1,6 l/10 000 m² ściany liści – LWA).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-3,0 l/ha (0,5 – 1,6 l/10 000 m² ściany liści – LWA)

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości: owoce mają typową barwę (BBCH 12-89).

Liczba zabiegów: 5

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 400-1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5

Załącznik nr 3 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Środek stosować zapobiegawczo (profilaktycznie) , zabiegi rozpocząć, gdy są warunki sprzyjające infekcjom i dalszemu rozwojowi choroby.

1. Środek zawiera żywy mikroorganizm jako substancję czynną (bakteria *Bacillus subtilis* - szczep IAB/BS03, z grupy BM02 wg klasyfikacji FRAC) i wykazuje średni poziom zwalczania lub ogranicza występowanie chorób. Dlatego nie we wszystkich przypadkach zastosowanie tylko tego środka będzie wystarczające do skutecznej ochrony uprawy. Z tego też względu do przyjętego programu ochrony zaleca się włączenie innych środków zalecanych do zwalczania tych samych chorób oraz zastosowanie innych metod niż zabiegi środkami grzybobójczymi, które są zgodne z zalecaniami integrowanej ochrony danej uprawy.
2. W przypadku stosowania środka zawierającego mikroorganizm w programach ochrony, gdzie przewidziane są zabiegi środkami chemicznymi, należy zachować szczególną ostrożność pomiędzy aplikacją takiego środka a zastosowaniem środków chemicznych. Wskazana jest w tym zakresie konsultacja z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.
3. Zabieg wykonać dokładnie pokrywając wszystkie części roślin cieczą użytkową.

Zalecana dawka środka w ochronie warzyw wysokich – uprawianych pionowo w szklarni i pod osłonami (np. pomidor, ogórek) odnosi się do faktycznej powierzchni opryskiwania, czyli bocznej powierzchni rzędu roślin, określanej jako „powierzchnia ściany liści” – LWA:

Powierzchnia ściany liści [m ² /ha]	=	$\frac{2 \times \text{wysokość opryskiwanej ściany liści [m]} \times 10\,000 \text{ [m}^2\text{/ha]}}{\text{rozstawa rzędów [m]}}$
--	---	--

Obliczenie dawki przestrzennej – zalecanej dawki środka na powierzchnię ściany liści - LWA:

Zalecana dawka środka na powierzchnię ściany liści - LWA [l/10 000 m ²]	=	$\frac{\text{Ilość środka [l/ha]} \times 10\,000 \text{ [m}^2\text{/ha]}}{\text{powierzchnia ściany liści [m}^2\text{/ha]}}$
---	---	--

Obliczenie ilości środka potrzebnego na 1 ha uprawy (l/ha) w celu sporządzenia cieczy użytkowej:

Ilość środka [l/ha]	=	$\frac{\text{Zalecana dawka środka na powierzchnię ściany liści - LWA [l/10\,000 m}^2\text{]} \times \text{powierzchnia ściany liści [m}^2\text{/ha]}}{10\,000 \text{ [m}^2\text{/ha]}}$
---------------------	---	--

Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki środka na 1 ha powierzchni uprawy nawet w sytuacji, gdy aktualna powierzchnia ściany liści (LWA) wskazywać może na potrzebę zastosowania wyższej dawki.

Załącznik nr 4 – OKRESY KARENCJI

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

1 dzień

Załącznik nr 5 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środek nie powinien być stosowany przez osoby z obniżoną odpornością lub poddawane leczeniu immunosupresyjnemu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę dróg oddechowych (półmaska samofiltrująca chroniąca przed aerozolami typu FFP3 lub półmaska (EN 140) wyposażona w atestowany filtr chroniący przed aerozolami (EN 143) klasy P3) oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) i czepek w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną podczas wkraczania na teren poddany zabiegowi.

Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą.

Unikać wdychania pyłu/rozpylonej cieczy.

Dokładnie umyć ręce/wziąć prysznic po zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
8 godzin.

Załącznik nr 6 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczoł.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Stosowanie środka w szklarniach o trwałej, odizolowanej od podłoża konstrukcji nie wymaga wyznaczania stref ochronnych ani stosowania technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej

Załącznik nr 7 - WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA ORAZ PIERWSZA POMOC

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- z dala od źródeł ciepła, promieniowania, elektryczności, środków utleniających i materiałów silnie kwaśnych lub zasadowych,
- w suchym i dobrze wentylowanym miejscu,
- w temperaturze poniżej 20°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne.

W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC:

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.

Załącznik nr 8 – POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Dane kontaktowe (takie jak: e-mail, telefon, fax, adres www lub adres do korespondencji) posiadacza zezwolenia określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin, jeżeli ma to zastosowanie, określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin, jeżeli ma to zastosowanie, określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ma to zastosowanie określa posiadacz zezwolenia.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ określa posiadacz zezwolenia z uwzględnieniem poniższych informacji:

- produkt należy wstrząsnąć przed użyciem
- pH wody użytej do przygotowania cieczy użytkowej powinno mieścić się pomiędzy 5 a 7.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY określa posiadacz zezwolenia.

Data produkcji - wskazuje posiadacz zezwolenia

Zawartość netto - wskazuje posiadacz zezwolenia

Nr partii - wskazuje posiadacz zezwolenia

Załącznik nr 9 - ZASTOSOWANIA MAŁOBSZAROWE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Pomidor, bakłażan (w uprawie w szklarni i w uprawie pod osłonami)

zgnilizna twardzikowa, antraknoza pomidora, miękka zgnilizna owoców powodowana przez grzyby rodzaju Mucor, szara plamistość liści pomidora

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha (1,4 l/10 000 m² ściany liści – LWA).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-3,0 l/ha (0,6 – 1,4 l/10 000 m² ściany liści – LWA).

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy pierwszego kwiatostanu (otwarty pierwszy kwiat na pędzie głównym) do fazy pełnej dojrzałości: owoce mają typową barwę (BBCH 61-89).

Liczba zabiegów: 5

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tej uprawie).

Papryka (w uprawie w szklarni i w uprawie pod osłonami)

zgnilizna twardzikowa antraknoza papryki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha (2,2 l/10 000 m² ściany liści – LWA).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-3,0 l/ha (0,9– 2,2 l/10 000 m² ściany liści – LWA).

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy pierwszego kwiatostanu (otwarty pierwszy kwiat) do fazy pełnej dojrzałości: owoce mają typową barwę (BBCH 61-89).

Liczba zabiegów: 5

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 700-1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tej uprawie).

Jarmuż, kapusta pak choi (w uprawie w szklarni i w uprawie pod osłonami)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-3,0 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy drugiego liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (BBCH 12-49).

Liczba zabiegów: 5

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 400-1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5

**Ogórek, dynia zwyczajna typ użytkowy: cukinia, kabaczek, patison
(w uprawie w szklarni i w uprawie pod osłonami)**

zgnilizna twardzikowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha (1,6 l/10 000 m² ściany liści – LWA).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-3,0 l/ha (0,5 – 1,6 l/10 000 m² ściany liści – LWA).

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 12-89).

Liczba zabiegów: 5

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tej uprawie).

Sałata, sałata japońska, sałata łodygowa, endywia, cykoria korzeniowa, cykoria sałatowa, szpinak, roszponka warzywna, rukola, szpinak, szpinak nowozelandzki (w uprawie w szklarni i w uprawie pod osłonami)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-3,0 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy 2. liścia do fazy, gdy główka osiągnęła typową wielkość i kształt i jest ciasno zamknięta lub wegetatywne części roślin przeznaczone do zbioru osiągnęły ostateczną, typową wielkość (BBCH 12-49).

Liczba zabiegów: 5

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 400-1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tej uprawie).

Kapusta, kalarepa, rzodkiew (w uprawie w szklarni i w uprawie pod osłonami)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-3,0 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy 2. liścia do fazy, gdy główka osiągnęła typową wielkość i kształt i jest ciasno zamknięta lub wegetatywne części roślin przeznaczone do zbioru osiągnęły ostateczną, typową wielkość (BBCH 12-49).

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 400-1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5

Rośliny zielarskie (w uprawie w szklarni i w uprawie pod osłonami)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-3,0 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy rozwiniętych dwóch liści właściwych (lub dwóch par liści lub dwóch okółków) do końcowej fazy kwitnienia (BBCH 12-67).

Liczba zabiegów: 5

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 400-1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5

Seler naciowy, seler listkowy, seler korzeniowy (w uprawie w szklarni i w uprawie pod osłonami)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-3,0 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy drugiego liścia do końca fazy rozwoju wegetatywnych części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 12-49).

Liczba zabiegów: 5

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 400-1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5

Marchew (w uprawie w szklarni i w uprawie pod osłonami)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-3,0 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy drugiego liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru: korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 12-49).

Liczba zabiegów: 5

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 18 lipca 2024 r. złożonym zgodnie z art. 40 rozporządzenia nr 1107/2009 spółka SEIPASA S.A., C/Almudévar 2, 22240 Tardienta, (Huesca), Królestwo Hiszpanii wystąpiła o wzajemne uznanie zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Fungisei.

Zgodnie z art. 40 rozporządzenia nr 1107/2009 posiadacz zezwolenia udzielonego zgodnie z art. 29 przedmiotowego rozporządzenia może złożyć wniosek o wzajemne uznanie zezwolenia dla tego samego środka ochrony roślin, takiego samego zastosowania i przy zastosowaniu porównywalnych praktyk rolnych w innym państwie członkowskim.

Przedmiotowy środek pod nazwą handlową Fungisei dopuszczony jest do obrotu w Republice Francuskiej zezwoleniem nr 2220430 z dnia 16 maja 2022 r.

W toku postępowania administracyjnego stwierdzono spełnienie wymagań w zakresie wzajemnego uznania zezwolenia określonych w art. 40-42, a także wymagań określonych w art. 47 rozporządzenia nr 1107/2009.

Na podstawie informacji uzyskanej z właściwego urzędu Republiki Francuskiej w dniu 31 października 2024 r. potwierdzono, że w skład środka nie wchodzi składniki obojętne wymienione w załączniku nr III do rozporządzenia nr 1107/2009.

Przy określaniu terminu ważności zezwolenia uwzględniono przepisy art. 32 rozporządzenia nr 1107/2009, zgodnie z którymi ważność zezwolenia ustala się na okres nieprzekraczający roku od daty wygaśnięcia ważności zatwierdzenia substancji czynnej zawartej w danym środku ochrony roślin. Tym samym, uwzględniając termin zatwierdzenia substancji czynnej zawartej w przedmiotowym środku, określony w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 540/2011⁵, termin ważności zezwolenia upływa z dniem 20 października 2035 r.

Dodatkowo wnioskiem z dnia 27 stycznia 2025 r. złożonym zgodnie z art. 51 rozporządzenia nr 1107/2009 spółka SEIPASA S.A., wystąpiła o uwzględnienie w zezwoleniu zastosowania środka w następujących zastosowaniach:

- pomidora, bakłażana (w uprawie w szklarni i w uprawie pod osłonami) w ochronie przed *zgnilizną twardzikową, antraknozą pomidora, miękką zgnilizną owoców powodowanych przez grzyby rodzaju Mucor i szarą plamistością liści pomidora*,

⁵ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 153 z 11.6.2011, str. 1, z późn. zm.)

- papryki (w uprawie w szklarni i w uprawie pod osłonami) w ochronie przed *zgnilizną twardzikową i antraknozą papryki*,
- ogórka, dyni zwyczajnej typ użytkowy: cukinia, kabaczek, patison (w uprawie w szklarni i w uprawie pod osłonami) w ochronie przed *zgnilizną twardzikową*,
- jarmużu, kapusty pak choi, sałaty, sałaty japońskiej, sałaty łodygowej, endywii, cykorii korzeniowej, cykorii sałatowej, szpinaku, roszponki warzywnej, rukoli, szpinaku, szpinaku nowozelandzkiego, kapusty, kalarepy, rzodkwi, selera naciowego, selera listkowego, selera korzeniowego, marchwi oraz roślin zielarskich (w uprawie w szklarni i w uprawie pod osłonami) w ochronie przed *szarą pleśnią i zgnilizną twardzikową*.

Co zostało zaakceptowane niniejszą decyzją. Biorąc powyższe pod uwagę środek może być stosowany w rozszerzonym zakresie w powyższych uprawach małoobszarowych przez wszystkich zainteresowanych jego stosowaniem użytkowników profesjonalnych, a odpowiedzialność za ewentualny brak skuteczności działania środka ochrony roślin i jego fitotoksyczność zgodnie z art. 51 ust. 5 rozporządzenia nr 1107/2009 ponosi osoba stosująca środek ochrony roślin.

Pismem z dnia 19 lutego 2025 r. w formie korespondencji e-mail, doręczonym spółce SEIPASA S.A., w tym samym dniu, strona została powiadomiona o zakończeniu postępowania wyjaśniającego. W treści zawiadomienia organ pouczył stronę, iż na zasadzie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (dalej: k.p.a.)^{6]}, został wyznaczony siedmiodniowy termin, liczony od dnia otrzymania pisma, na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów. W dniu 18 marca 2024 r. pełnomocnik spółki odpowiedział na zawiadomienie i wniósł uwagi. Następnie toczyła się korespondencja email zakończona ostatecznie w dniu 24 marca 2025 r., w wyniku której wniosek został uzupełniony, a uwagi częściowo zaakceptowane.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Opłaty

^{6]} Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.)

Czynności związane z wydaniem przedmiotowego zezwolenia podlegają opłacie na podstawie art. 15 ust.1 ustawy o środkach ochrony roślin. W związku z powyższym, wydanie stosownej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej⁷.

Pouczenie

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127§3 k.p.a.

Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 zł.

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, zgodnie z art. 239§1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi⁸ albo przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243§1 tej ustawy. Strona może również, stosownie do treści art. 127a k.p.a. zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztof Smaczyński
zastępca dyrektora
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:

(za zwrotnym dowodem doręczenia)

⁷ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111, póź. zm.)

⁸ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 935, z póź. zm.)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(zezwoenia.sor@piorin.gov.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB
(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa
(ochrona.roslin@inhort.pl)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod adresem:
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych