


DZIAŁ I
SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
I ZDROWOTNA

Województwo zachodniopomorskie położone jest w północno-zachodniej części Polski. Obejmuje 21 powiatów, w tym 3 grodzkie i 18 ziemskich. W województwie znajdują się 63 miasta, w tym 3 miasta na prawach powiatu. Jest to piąty, co do wielkości region Polski, o powierzchni 22,9 tys. km² i jedenasty pod względem liczby mieszkańców. Stolicą województwa jest Szczecin.



W związku z tym, że dane statystyczne dotyczące liczby ludności w 2011 dostępne będą po opracowaniu przez GUS wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 w IV kwartale 2012 r. do obliczania wskaźników za 2011 rok posłużono się danymi demograficznymi za 2010 rok.

Z tego samego powodu sytuacja demograficzna odnośnie liczby ludności według powiatów i grup wiekowych została przedstawiona za rok 2010.

W dniu 31 grudnia 2010 r. na obszarze województwa zachodniopomorskiego zamieszkiwało 1 693 072 osób (4,4 % ludności Polski). Liczba mężczyzn wynosiła 821 132, a liczba kobiet wynosiła 871 940. Populacja mężczyzn wynosiła 48,5% ogółu ludności województwa, natomiast populacja kobiet wynosiła 51,5%. W 2010 roku udział procentowy kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie ludności był taki sam jak w roku poprzednim. Liczba mieszkańców miast była większa niż liczba mieszkańców wsi. Wielkości te wynosiły odpowiednio: 1 164 509 mieszkańców w miastach, co stanowiło 68,8% ogólnej liczby mieszkańców województwa oraz 528 563 mieszkańców wsi 31,2 % mieszkańców województwa. Największą liczbę mieszkańców wśród powiatów i miast na prawach powiatu miały:

- miasto Szczecin 405 606

- pow. stargardzki 119 306
- miasto Koszalin 107 948
- pow. gryfiński 82 727
- pow. goleniowski 80 305

Najmniejszą liczbę mieszkańców wśród powiatów i miast na prawach powiatu miały:

- pow. łobeski 37 900
- pow. pyrzycki 39 774
- miasto Świnoujście 40 759
- pow. kamieński 47 672
- pow. białogardzki 48 193

Struktura ludności według grup wiekowych w 2010 r. była zbliżona do struktury z roku 2009. Odnotowano nieznaczny spadek udziału procentowego w ogólnej liczbie ludności zarówno osób w wieku przedprodukcyjnym (o 0,3%), jak i w wieku produkcyjnym (o 0,1%), natomiast udział procentowy osób w wieku poprodukcyjnym nieznacznie wzrósł (o 0,4%).

W sytuacji demograficznej województwa w 2011 roku odnotowano spadek wskaźnika przyrostu naturalnego na 1000 ludności (o 0,6) i wskaźnika urodzeń żywych na 1000 ludności (o 0,7) oraz spadek wskaźnika zgonów na 1000 ludności (o 0,2). Wzrost wskaźnika przyrostu naturalnego odnotowano tylko w powiecie świdwińskim i wałeckim (o 0,5) oraz w mieście Koszalinie (o 0,3), a w pozostałych powiatach odnotowano spadek. Największy spadek wskaźnika przyrostu naturalnego wystąpił w powiecie białogardzkim (o 1,7), polickim (o 1,4) oraz gryfickim (o 1,2). Ujemny przyrost naturalny odnotowano w mieście Szczecinie i mieście Świnoujściu oraz w powiatach: choszczeńskim, gryfickim, kamieńskim, łobeskim, szczecineckim, świdwińskim.

Przeciętne trwanie życia w województwie zachodniopomorskim w 2010 roku było dłuższe o 8,8 roku u kobiet niż u mężczyzn. Różnice w długości życia kobiet i mężczyzn odnotowano zarówno w naszym województwie, jak i w kraju. W 2010 roku w województwie kobiety żyły średnio 80,1 lat (w kraju 80,6), natomiast mężczyźni żyli 71,3 lata (w kraju 72,1). W województwie u kobiet odnotowano wydłużenie życia (o 0,6 roku), natomiast u mężczyzn (o 0,3 roku). Przeciętne trwanie życia wydłuża się i następuje stopniowe starzenie się społeczeństwa.

W 2010 roku w województwie zanotowano 16 529 zgonów, to jest o 158 zgonów więcej niż w roku poprzednim. Z ogólnej liczby zgonów na mężczyzn przypadało 8 972 zgony (o 50 więcej niż w roku 2009), a na kobiety 7 557 zgonów (o 108 więcej niż w roku 2009). Analizując zgony według płci osób zmarłych stwierdzamy, iż znacznie

więcej umiera mężczyzn niż kobiet. W województwie zachodniopomorskim w 2010 roku wskaźnik zgonów ogółem na 1000 ludności wynosił 9,8; dla mężczyzn 10,9, natomiast dla kobiet 8,7. W porównaniu z rokiem 2009 wskaźnik ten dla mężczyzn nie uległ zmianie, a dla kobiet zwiększył się o 0,2.

Najwyższy wskaźnik zgonów na 1000 ludności w 2010 roku wśród powiatów i miast na prawach powiatu miały:

- powiat świdwiński - 11,8
- powiat łobeski - 10,7
- powiat gryficki i szczecinecki - 10,4
- powiat choszczeński - 10,3
- powiat drawski, kamieński i m. Szczecin - 10,2

Najniższy wskaźnik zgonów na 1000 ludności w 2010 roku wśród powiatów i miast na prawach powiatu miały:

- powiat policki - 6,2
- miasto Koszalin - 8,7
- powiat kołobrzeski - 8,9
- powiat goleniowski i stargardzki - 9,3
- powiat sławieński - 9,5

Głównymi przyczynami zgonów w 2010 roku były choroby układu krążenia, nowotwory i zewnętrzne przyczyny zgonów (urazy, upadki, wypadki, zatrucia, samobójstwa i zabójstwa). W grupie głównych przyczyn zgonów znalazły się również objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych. Rozpatrując strukturę przyczyn zgonów stwierdzamy, iż najwyższy odsetek (44,8%) stanowiły zgony z powodu chorób układu krążenia. W województwie zachodniopomorskim w 2010 roku z tego powodu zmarło 7 405 osób (o 152 więcej niż w roku 2009); z tego zmarło 3 625 mężczyzn (40,4% zgonów mężczyzn), a kobiet 3 780 (50,0% zgonów kobiet). Wskaźnik liczby zgonów na choroby układu krążenia na 10 tys. ludności wynosił 43,7 i był wyższy o 0,9 niż roku poprzednim.

Drugą podstawową przyczyną zgonów były choroby nowotworowe. W województwie zachodniopomorskim w 2010 roku zmarło z tego powodu 4 468 osób, co stanowiło 27,0% ogólnej liczby zgonów. Mężczyzn zmarło 2 499 (27,9% zgonów mężczyzn), a kobiet 1 969 (26,1% zgonów kobiet). Wskaźnik liczby zgonów na nowotwory na 10 tys. ludności w 2010 roku wynosił 26,4 i wzrósł o 1,1 w stosunku do roku poprzedniego. Z ogólnej liczby zgonów na choroby nowotworowe 96,4% miało charakter złośliwy. Liczba wszystkich zgonów na nowotwory złośliwe w 2010 roku wynosiła 4 305

osób (o 165 osób więcej niż w 2009 r.), z tego mężczyzn zmarło 2 419 (o 118 osób więcej), natomiast kobiet zmarło 1 886 (o 47 osób więcej niż w roku poprzednim).

Biorąc pod uwagę miejsca lokalizacji procesu nowotworowego u mężczyzn najczęściej obejmowały one:

- oskrzela i płuca - 752 zgony (o 68 więcej niż w roku 2009),
- jelito grube, zgięcie esiczo-odbytnicze, odbytnicę i odbył - 275 zgonów (o 26 więcej niż w roku 2009),
- miejsca niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu - 234 zgony (o 3 mniej niż w roku 2009),
- gruczoł krokowy - 166 zgonów (o 31 więcej niż w roku 2009),
- żołądek - 144 zgony (o 7 mniej niż w roku 2009),

U kobiet choroba nowotworowa najczęściej obejmowała:

- oskrzela i płuca - 338 zgonów (o 29 więcej niż w roku 2009),
- jelito grube, zgięcie esiczo-odbytnicze, odbytnicę i odbył - 212 zgonów (o 11 więcej niż w 2009 roku),
- miejsca niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu - 207 zgonów (o 36 mniej niż w roku 2009),
- sutek - 196 zgonów (o 15 mniej niż w roku 2009),
- jajniki - 138 zgonów (o 32 więcej niż w roku 2009).

Struktura zgonów na nowotwory złośliwe według przyczyn, kształtowała się następująco:

- nowotwór złośliwy narządów trawiennych - 27,2%,
- nowotwór złośliwy narządów oddechowych i klatki piersiowej - 27,0%,
- nowotwory złośliwe niedokładnie określone i wtórne - 10,3%,
- pozostałe nowotwory złośliwe - 7,7%,
- nowotwór złośliwy żeńskich narządów płciowych - 6,8%,
- nowotwór złośliwy układu moczowego - 6,4%,
- nowotwór złośliwy tkanki krwiotwórczej i limfatycznej - 5,9%,
- nowotwór złośliwy sutka - 4,6%,
- nowotwór złośliwy męskich narządów płciowych - 4,1%.

Na trzecim miejscu wśród przyczyn zgonów znajdowały się przyczyny zewnętrzne, czyli urazy i zatrucia. W województwie zachodniopomorskim w 2010 roku zmarło z tego powodu 1 129 osób (867 mężczyzn i 262 kobiety), co stanowiło 6,8% ogólnej liczby zgonów. Wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 6,7 i zmniejszył się (o 0,7) w stosunku

do roku poprzedniego, przy czym wskaźnik ten dla mężczyzn był dużo większy niż dla kobiet.

Czwartą przyczyną zgonów były objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych. W 2010 roku zmarło z tego powodu 1 098 osób (o 76 osób więcej niż w 2009 roku), co stanowiło 6,7% wszystkich zgonów, z czego mężczyzn zmarło 687 (7,7% liczby zgonów mężczyzn), a kobiet 411 (5,4% liczby zgonów kobiet). W 2010 roku wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 6,5 i był większy niż w latach poprzednich.

Kolejnymi przyczynami zgonów były choroby układu trawiennego i oddechowego. W 2010 roku na choroby układu trawiennego zmarło razem 740 osób (o 12 więcej niż w roku 2009), z tego 414 mężczyzn (o 4 osoby mniej) i 326 kobiet (o 16 osób więcej), natomiast na choroby układu oddechowego zmarło 711 osób (o 82 osoby mniej niż w roku 2009), w tym 399 mężczyzn (o 62 osoby mniej) i 312 kobiet (o 20 osób mniej). Zgony z powodu chorób układu trawiennego stanowiły 4,5% ogólnej liczby zgonów, natomiast zgony z powodu chorób układu oddechowego stanowiły 4,3% wszystkich zgonów. Wartość wskaźnika na 10 tys. ludności dla układu trawiennego utrzymywała się w 2010 r. na zbliżonym poziomie, natomiast dla układu oddechowego spadła o 0,5.

Następną grupą przyczyn zgonów były zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej. W województwie w 2010 roku z tego powodu zmarło 282 osoby, to jest 1,7% ogółu zgonów, z czego mężczyzn zmarło 117, a kobiet 165. Wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 1,7.

W 2010 roku z powodu pozostałych przyczyn zgonów zmarło łącznie 696 osób, co stanowiło 4,2% ogólnej liczby zgonów. Wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 4,1.

Struktura zgonów w 2010 roku według przyczyn kształtowała się następująco:

- choroby układu krążenia - 44,8%,
- nowotwory - 27,0%,
- zewnętrzne przyczyny zgonu - 6,8%,
- objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe
wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych - 6,7%,
- choroby układu trawiennego - 4,5%,
- choroby układu oddechowego - 4,3%,
- pozostałe przyczyny zgonów - 4,2%,
- zaburzenia wydzielania wewnętrznego,
stanu odżywiania i przemiany materii - 1,7%.

W 2010 roku zmarło 91 niemowląt, wskaźnik na 1000 urodzeń żywych wynosił 5,2 (w kraju 5,0). Najczęstszą przyczyną zgonów niemowląt były niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym - 56 zgonów (o 15 mniej niż w roku 2009), wskaźnik wynosił 3,2. Następną przyczyną zgonów były wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe, w wyniku których zmarło 27 niemowląt (o 7 mniej niż w roku 2009), wskaźnik wynosił 1,6. Liczba zgonów z powodu objawów, cech chorobowych i nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowanych była mniejsza niż w 2009 roku (o 3) i wynosiła 5 (wskaźnik wynosił 0,3). Odnotowano również 3 zgony z powodu chorób układu nerwowego, oddechowego i krążenia.

ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE

W województwie zachodniopomorskim w 2011 r. wg danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wśród chorób zakaźnych, zakażeń i zatruc podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu najwięcej zachorowań odnotowano z powodu:

- **grypy i podejrzeń zachorowań na grypę – 21 991 zachorowań**
(wskaźnik na 100 tys. ludności w woj. zachodniopomorskim wyniósł 1 298,5, w kraju 3 027,9),
- **ospy wietrznej – 7 650 zachorowań**
(wskaźnik na 100 tys. ludności w woj. zachodniopomorskim wyniósł 451,7, w kraju 452,7),
- **wirusowych zakażeń jelitowych – 2 593 zachorowania**
(wskaźnik na 100 tys. ludności w woj. zachodniopomorskim wyniósł 153,1, w kraju 117,6),
- **biegunek i zapaleń żołądkowo – jelitowych BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu – 1 783 zachorowania**
(wskaźnik na 100 tys. ludności w woj. zachodniopomorskim wyniósł 105,3, w kraju 92,2),
- **biegunek u dzieci do lat 2 – 1 321 zachorowań**
(wskaźnik na 100 tys. populacji w grupie wiekowej od 0 do 2 lat w woj. zachodniopomorskim wyniósł 3 683,1, w kraju 4 375,6),
- **szkarlatyny – 701 zachorowań**
(wskaźnik na 100 tys. ludności w woj. zachodniopomorskim wyniósł 41,4, w kraju 47,8),
- **bakteryjnych zatruc pokarmowych – 632 zachorowania**

(wskaźnik na 100 tys. ludności w woj. zachodniopomorskim wyniósł 37,3, w kraju 28,4).

W porównaniu do roku 2010 najbardziej wzrosła liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę (o 9 590). Znaczny wzrost odnotowano również w przypadku wirusowego zakażenia jelitowego (o 1 360), biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowego BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu (o 1 345) oraz ospy wietrznej (o 1 303). Zauważamy, że zdecydowanie wzrosła liczba zachorowań na AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności (o 25). Natomiast spadek odnotowano w przypadku zachorowań na salmonellozy (o 42), inne bakteryjne zakażenia jelitowe (o 22) oraz boreliozę z Lyme (o 13).

W większości przypadków liczba zachorowań na 100 tys. ludności w województwie zachodniopomorskim była niższa niż w kraju. Największe różnice wystąpiły w przypadku zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań na grypę (wskaźnik wojewódzki – 1 298,5, wskaźnik krajowy – 3 027,9) oraz zachorowań na biegunki u dzieci do lat 2 (wskaźnik wojewódzki – 3 683,1, wskaźnik krajowy – 4 375,6).

W przypadku większej wartości liczby zachorowań na 100 tys. ludności w województwie zachodniopomorskim niż w kraju, największe różnice obserwujemy w zachorowaniach na następujące choroby zakaźne: wirusowe zakażenie jelitowe (wskaźnik wojewódzki – 153,1, wskaźnik krajowy – 117,6), biegunki i zapalenia żołądkowo – jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu (wskaźnik wojewódzki – 105,3, wskaźnik krajowy – 92,2), różyczkę (wskaźnik wojewódzki – 23,3, wskaźnik krajowy – 11,2) oraz bakteryjne zatrucia pokarmowe (wskaźnik wojewódzki – 37,3, wskaźnik krajowy – 28,4).

ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE

Liczba zachorowań na kiłę w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku była taka sama jak w roku ubiegłym i wynosiła 39. Wskaźnik zachorowań na kiłę na 100 tys. mieszkańców wyniósł 2,3.

W 2011 roku odnotowano 4 przypadki zachorowań na rzeżączkę, a więc mniej niż w roku ubiegłym (10 przypadków w 2010 roku). Wskaźnik zachorowań na rzeżączkę na 100 tys. mieszkańców wynosił 0,2 i był mniejszy niż w 2010 roku (0,6).

ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ

W 2011 roku zanotowano 322 przypadki nowych zachorowań na wszystkie postacie gruźlicy, w tym 302 przypadki zachorowań na gruźlicę płuc i 20 przypadków na gruźlicę innych narządów. Wskaźnik zachorowalności na gruźlicę na 100 tys. mieszkańców wynosił 19,0 i wzrósł w stosunku do 2010 roku (15,4). Znacznie więcej przypadków nowych zachorowań na gruźlicę odnotowano w miastach (222 przypadki) niż na wsiach (100 przypadków). Więcej nowych zachorowań na gruźlicę zanotowano wśród mężczyzn (208 przypadków) niż wśród kobiet (114 przypadków). W stosunku do roku ubiegłego liczba zachorowań wzrosła zarówno wśród mężczyzn (o 38) jak i wśród kobiet (o 24). Biorąc pod uwagę poszczególne grupy wiekowe zauważamy, że w grupie wiekowej 0-14 lat nie odnotowano żadnego przypadku zachorowań, natomiast najwięcej przypadków zachorowań odnotowano w grupie wiekowej 45-64 lata (162 przypadki).

ZDROWIE PSYCHICZNE

W poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dla osób uzależnionych według stanu na dzień 31.12.2011 r. pracowało razem 143 lekarzy, w tym 129 psychiatrów (25 z I° specjalizacji i 104 z II° specjalizacji), 52 pielęgniarki, 105 psychologów, 17 pracowników socjalnych i 109 terapeutów. W grupie terapeutów znaleźli się: specjaliści terapii uzależnień, instruktorzy terapii uzależnień, terapeuci zajęciowi i inni terapeuci. We wszystkich rodzajach poradni udzielono łącznie **280 741** porad, to jest o 21 642 porady więcej niż w roku 2010.

Z ogólnej liczby udzielono:

- 165 260 porad w poradniach zdrowia psychicznego,
- 9 184 porady w poradniach psychologicznych,
- 78 148 porad w poradniach odwykowych,
- 28 149 porad w poradniach dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

W 2011 roku w poradniach dla chorych psychicznie i uzależnionych przyjęto ogółem **55 022** pacjentów (nie uwzględnia się pacjentów leczonych w poradniach psychologicznych – 545 osób), z czego po raz pierwszy **16 465** (bez pacjentów leczonych w poradniach psychologicznych – 149 osób).

Najliczniejszą grupę stanowili leczeni z powodu zaburzeń psychicznych (bez uzależnień) – 44 434 osoby. Liczba leczonych nie zawiera liczby pacjentów leczonych w poradniach psychologicznych (545 osób). Wśród tej grupy najwięcej osób leczyło się z powodu:

- zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i somatoformicznych – 14 008 osób (wskaźnik na 100 tys. ludności – 827,2),
- schizofrenii – 5 935 osób (wskaźnik na 100 tys. ludności – 350,5),
- organicznych zaburzeń niepsychotycznych – 4 423 osoby (wskaźnik na 100 tys. ludności – 261,2),
- organicznych zaburzeń psychotycznych – 3 766 osób (wskaźnik na 100 tys. ludności – 222,4),
- epizodów afektywnych – 3 414 osób (wskaźnik na 100 tys. ludności – 201,6).

Na dalszych miejscach znalazły się: depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (3 133 leczonych), upośledzenie umysłowe (2 310 leczonych), zaburzenia osobowości i zachowań dorosłych (1 694 leczonych), zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (1 544 leczonych), inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe (1 222 leczonych) oraz inne zaburzenia nastroju (1 178 leczonych). Pozostałą liczbę 1 807 osób stanowili leczeni z powodu nieokreślonych zaburzeń psychicznych, całościowych zaburzeń rozwojowych, zespołów behawioralnych związanych z zaburzeniami odżywiania, innych zespołów behawioralnych związanych z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi oraz pozostałych zaburzeń rozwoju psychicznego.

W 2011 r. w porównaniu do roku ubiegłego ogólna liczba leczonych z powodu zaburzeń psychicznych (bez uzależnień) wzrosła o 3 532 osoby, a liczba leczonych po raz pierwszy w życiu o 1 130.

Z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych w 2011 r. leczyło się 1 782 osoby (z czego 689 osób po raz pierwszy w życiu). W tej grupie najwięcej pacjentów zarejestrowanych było z powodu:

- zespołu uzależnienia i zespołu abstynencyjnego od kilku substancji lub innych substancji psychoaktywnych – 528 osób (wskaźnik na 100 tys. ludności 31,2),
- zespołu uzależnienia i zespołu abstynencyjnego od leków uspokajających i nasennych – 287 osób (wskaźnik na 100 tys. ludności 16,9),
- ostrego zatrucia i używania szkodliwego kilku substancji lub innych substancji psychoaktywnych – 195 osób (wskaźnik na 100 tys. ludności 11,5),

- ostrego zatrucia i używania szkodliwego leków uspokajających i nasennych – 150 osób
(wskaźnik na 100 tys. ludności 8,9),
- ostrego zatrucia i używania szkodliwego kanabinoli – 127 osób
(wskaźnik na 100 tys. ludności 7,5).
- zespołu uzależnienia i zespołu abstynencyjnego od opiatów – 95 osób
(wskaźnik na 100 tys. ludności 5,6).

Z powodu zaburzeń psychicznych wywołanych używaniem tytoniu leczyło się 14 osób. Na pozostałe zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych leczyło się 386 pacjentów.

W 2011 r. w porównaniu do roku poprzedniego ogólna liczba leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych wzrosła o 137 osób, a liczba leczonych po raz pierwszy w życiu o 30.

W 2011 roku z powodu zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem alkoholu leczyło się ogółem 8 806 pacjentów, z tego po raz pierwszy w życiu 3 579. Natomiast zobowiązanych do leczenia odwykowego było 1 112 osób.

Najwięcej pacjentów leczyło się z powodu:

- zespołu uzależnienia – 5 932 osoby
(wskaźnik na 100 tys. ludności 350,3),
- ostrego zatrucia – 996 osób
(wskaźnik na 100 tys. 58,8),
- zespołu abstynencyjnego bez majaczenia – 833 osoby
(wskaźnik na 100 tys. 49,2),
- używania szkodliwego – 674 osoby
(wskaźnik na 100 tys. 39,8).

Pozostałą liczbę 371 osób stanowili leczeni z powodu innych zaburzeń psychicznych, zaburzeń psychotycznych bez majaczenia, zespołu abstynencyjnego z majaczeniem oraz zespołu amnestycznego.

W porównaniu do roku ubiegłego, ogólna liczba leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu w 2011 roku wzrosła o 149 osób, a liczba leczonych po raz pierwszy wzrosła o 379 osób.

TABL. 1.1

LUDNOŚĆ WEDŁUG POWIATÓW

(stan w dniu 31.12.2010 r.)

Powiaty	Ludność ogółem	Z tego			
		mężczyźni	kobiety	miasta	wieś
WOJEWÓDZTWO 2010	1 693 072	821 132	871 940	1 164 509	528 563
m. Koszalin	107 948	51 182	56 766	107 948	-
m. Szczecin	405 606	192 246	213 360	405 606	-
m. Świnoujście	40 759	19 689	21 070	40 759	-
białogardzki	48 193	23 603	24 590	32 523	15 670
choszczeński	49 574	24 595	24 979	23 697	25 877
drawski	57 353	28 015	29 338	35 747	21 606
goleniowski	80 305	39 389	40 916	42 426	37 879
gryficki	60 569	29 725	30 844	30 707	29 862
gryfiński	82 727	40 994	41 733	37 850	44 877
kamieński	47 672	23 243	24 429	24 990	22 682
kołobrzeski	77 244	37 034	40 210	44 984	32 260
koszaliński	64 411	32 047	32 364	13 815	50 596
łobeski	37 900	18 644	19 256	20 098	17 802
myśliborski	66 972	32 961	34 011	39 486	27 486
policki	70 380	34 600	35 780	35 188	35 192
pyrzycki	39 774	19 778	19 996	16 741	23 033
ślawieński	57 251	28 043	29 208	26 974	30 277
stargardzki	119 306	58 249	61 057	78 660	40 646
szczecinecki	76 900	37 249	39 651	49 584	27 316
świdwiński	48 205	23 659	24 546	23 859	24 346
wałeckie	54 023	26 187	27 836	32 867	21 156


Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

TABL. 1.2 LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W 2010 ROKU

Grupy wiekowe	Ludność ogółem	Miasto	Wieś
WOJEWÓDZTWO 2010	1 693 072	1 164 509	528 563
Wiek przedprodukcyjny	312 929	198 735	114 194
0 – 4 lata	86 707	56 707	30 000
5 – 9 lat	78 202	49 626	28 576
10 – 14 lat	86 370	53 252	33 118
15 – 17 lat	61 650	39 150	22 500
Wiek produkcyjny	1 112 013	766 454	345 559
mężczyźni 18 – 64 lata	582 770	396 280	186 490
kobiety 18 – 59 lat	529 243	370 174	159 069
Wiek poprodukcyjny	268 130	199 320	68 810
mężczyźni 65 lat i więcej	77 696	57 501	20 195
kobiety 60 lat i więcej	190 434	141 819	48 615
w % do ogólnej liczby ludności			
wiek przedprodukcyjny	18,5%	17,1%	21,6%
wiek produkcyjny	65,7%	65,8%	65,4%
wiek poprodukcyjny	15,8%	17,1%	13,0%

Źródło: Tabulogramy GUS. Ludność według płci, wieku, województw i powiatów w 2010 roku

LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W 2010 ROKU
- % ogólnej liczby ludności




TABL. 1.3 RUCH NATURALNY WEDŁUG POWIATÓW W 2011 ROKU

Powiaty	Urodzenia żywe	Zgony ogółem	Przyrost naturalny	Wskaźnik na 1000 ludności		
				urodzenia żywe	zgony	przyrost naturalny
WOJEWÓDZTWO 2011	16 002	16 149	-147	9,5	9,6	- 0,1
m. Koszalin	985	925	60	9,3	8,7	0,6
m. Szczecin	3 455	4 136	-681	8,7	10,4	-1,7
m. Świnoujście	321	391	-70	7,9	9,6	-1,7
białogardzki	476	470	6	9,8	9,7	0,1
choszczeński	466	498	-32	9,3	9,9	-0,6
drawski	568	532	36	9,8	9,1	0,6
goleniowski	830	752	78	10,3	9,3	1,0
gryficki	614	643	-29	10,0	10,5	-0,5
gryfiński	834	771	63	10,0	9,2	0,8
kamieński	410	474	-64	8,5	9,9	-1,3
kołobrzeski	706	687	19	9,2	8,9	0,2
koszaliński	637	565	72	9,9	8,7	1,1
łobeski	373	402	-29	9,7	10,5	-0,8
myśliborski	679	631	48	10,0	9,3	0,7
policki	730	474	256	10,4	6,7	3,6
pyrzycki	406	408	-2	10,1	10,2	0,0
ślawieński	603	575	28	10,5	10,0	0,5
stargardzki	1 160	1 089	71	9,7	9,1	0,6
szczecinecki	766	782	-16	9,9	10,1	-0,2
świdwiński	432	466	-34	8,9	9,6	-0,7
wałeczki	551	478	73	10,1	8,8	1,3

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

PRZYROST NATURALNY WEDŁUG POWIATÓW W 2011 ROKU




TABL.1.4

RUCH NATURALNY NA 1000 LUDNOŚCI

Lata	Polska			Województwo		
	urodzenia	zgony	przyrost naturalny	urodzenia	zgony	przyrost naturalny
2010	10,8	9,9	0,9	10,2	9,8	0,5
2011	10,2	9,8	0,3	9,5	9,6	-0,1

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

**PRZYRÓST NATURALNY NA 1000 LUDNOŚCI
W WOJEWÓDZTWIE NA TŁE KRAJU**


TABL. 1.5

**PRZECIĘTNE TRWANIE ŻYCIA
W LATACH 2000-2010**


Lata	Polska		Województwo	
	mężczyźni	kobiety	mężczyźni	kobiety
2000	69,7	78,0	69,0	77,5
2001	70,2	78,4	70,0	77,9
2002	70,4	78,8	69,9	78,3
2003	70,5	78,9	70,1	78,5
2004	70,7	79,2	70,3	78,5
2005	70,8	79,4	70,6	78,8
2006	70,9	79,6	70,5	79,1
2007	71,0	79,7	70,6	79,2
2008	71,3	80,0	70,6	79,6
2009	71,5	80,1	71,0	79,5
2010	72,1	80,6	71,3	80,1

Źródło: Roczniki Demograficzne GUS

**PRZECIĘTNE TRWANIE ŻYCIA W LATACH 2000-2010
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE**



**PRZECIĘTNE TRWANIE ŻYCIA W LATACH 2000-2010
POLSKA**



TABL. 1.6


ZGONY WEDŁUG PŁCI W POWIATACH W 2010 ROKU
liczby bezwzględne i wskaźnik na 1000 ludności

Powiaty	Liczby bezwzględne			Wskaźnik na 1000 ludności		
	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
WOJEWÓDZTWO 2010	16 529	8 972	7 557	9,8	10,9	8,7
m. Koszalin	937	508	429	8,7	9,9	7,6
m. Szczecin	4 155	2 163	1 992	10,2	11,2	9,3
m. Świnoujście	390	207	183	9,6	10,5	8,7
białogardzki	483	265	218	10,0	11,2	8,9
choszczeński	513	290	223	10,3	11,8	8,9
drawski	585	325	260	10,2	11,6	8,8
goleniowski	749	449	300	9,3	11,4	7,4
gryficki	632	344	288	10,4	11,6	9,3
gryfiński	828	459	369	10,0	11,2	8,8
kamieński	485	253	232	10,2	10,9	9,5
kołobrzeski	690	378	312	8,9	10,2	7,8
koszaliński	623	330	293	9,7	10,3	9,1
łobeski	408	216	192	10,7	11,6	9,9
myśliborski	659	372	287	9,8	11,3	8,4
policki	432	219	213	6,2	6,4	6,0
pyrzycki	396	220	176	9,9	11,1	8,8
sławieński	546	293	253	9,5	10,4	8,6
stargardzki	1 115	622	493	9,3	10,7	8,1
szczecinecki	802	452	350	10,4	12,1	8,8
świdwiński	571	302	269	11,8	12,7	10,9
walecki	530	305	225	9,8	11,6	8,1


Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

ZGONY WEDŁUG PŁCI W POWIATACH W 2010 ROKU

- wskaźnik na 1000 ludności



ZGONY WEDŁUG PŁCI W LATACH 2002-2010




TABL. 1.7 ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN W POWIATACH W 2010 ROKU
liczby bezwzględne

Powiaty	Zgony ogółem	W tym z powodu							
		chorób układu krążenia	nowo- tworów	zewnę- trznych przyczyn zgonu	chorób układu trawien- nego	chorób układu oddech- owego	objawów, cech chorobowych oraz nieprawidł- owych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych	zaburzenia wydzielania wewnę- trznego, stanu odżywiania	pozo- stałych
WOJEWÓDZTWO 2010	16 529	7 405	4 468	1 129	740	711	1 098	282	696
m. Koszalin	937	384	328	56	34	38	57	12	28
m. Szczecin	4 155	1 833	1 163	236	205	189	271	66	192
m. Świnoujście	390	185	98	23	17	18	31	6	12
białogardzki	483	236	132	31	26	20	14	7	17
choszczeński	513	237	124	44	20	27	26	9	26
drawski	585	303	135	46	25	13	39	11	13
goleniowski	749	328	195	74	31	38	34	18	31
gryficki	632	283	169	46	21	31	57	5	20
gryfiński	828	384	210	64	36	25	50	22	37
kamieński	485	234	112	42	24	21	38	8	6
kołobrzesci	690	242	197	33	20	28	120	13	37
koszaliński	623	245	204	43	16	29	44	17	25
łobeski	408	193	94	31	20	26	14	6	24
myśliborski	659	322	147	38	29	40	35	16	32
policki	432	172	123	20	19	26	40	5	27
pyrzycki	396	191	102	21	23	13	27	7	12
ślawieński	546	264	150	39	23	11	40	2	17
stargardzki	1 115	476	301	86	54	47	69	18	64
szczecinecki	802	364	226	65	40	16	45	16	30
świdwiński	571	267	143	48	28	21	35	10	19
walecki	530	262	115	43	29	34	12	8	27

Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

STRUKTURA ZGONÓW WEDŁUG PRZYCZYN W 2010 ROKU
- udział procentowy




TABL. 1.7.1 ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN W POWIATACH W 2010 ROKU
wskaźnik na 10 tys. ludności

Powiaty	Zgony ogółem	W tym z powodu							
		chorób układu krążenia	nowotworów	zewnętrznych przyczyn zgonu	chorób układu trawien- nego	chorób układu oddech-owego	objawów, cech chorobowych oraz nieprawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych	zaburzenia wydzielania wewnętrz- nego, stanu odżywiania	pozo- stałych
WOJEWÓDZTWO 2010	97,6	43,7	26,4	6,7	4,4	4,2	6,5	1,7	4,1
m. Koszalin	86,7	35,5	30,4	5,2	3,1	3,5	5,3	1,1	2,6
m. Szczecin	102,4	45,2	28,6	5,8	5,0	4,7	6,7	1,6	4,7
m. Świnoujście	95,7	45,4	24,0	5,6	4,2	4,4	7,6	1,5	2,9
białogardzki	100,2	48,9	27,4	6,4	5,4	4,1	2,9	1,5	3,5
choszczeński	103,3	47,7	25,0	8,9	4,0	5,4	5,2	1,8	5,2
drawski	101,8	52,8	23,5	8,0	4,4	2,3	6,8	1,9	2,3
goleniowski	93,5	40,9	24,3	9,2	3,9	4,7	4,2	2,2	3,9
gryficki	104,3	46,7	27,9	7,6	3,5	5,1	9,4	0,8	3,3
gryfiński	100,0	46,4	25,4	7,7	4,3	3,0	6,0	2,7	4,5
kamieński	101,7	49,1	23,5	8,8	5,0	4,4	8,0	1,7	1,3
kołobrzesci	89,4	31,4	25,5	4,3	2,6	3,6	15,5	1,7	4,8
koszaliński	97,1	38,2	31,8	6,7	2,5	4,5	6,9	2,6	3,9
łobeski	107,4	50,8	24,7	8,2	5,3	6,8	3,7	1,6	6,3
myśliborski	98,3	48,0	21,9	5,7	4,3	6,0	5,2	2,4	4,8
policki	62,0	24,7	17,6	2,9	2,7	3,7	5,7	0,7	3,9
pyrzycki	99,3	47,9	25,6	5,3	5,8	3,3	6,8	1,8	3,0
ślawieński	95,2	46,0	26,2	6,8	4,0	1,9	7,0	0,3	3,0
stargardzki	93,4	39,9	25,2	7,2	4,5	3,9	5,8	1,5	5,4
szczecinecki	104,1	47,2	29,3	8,4	5,2	2,1	5,8	2,1	3,9
świdwiński	118,1	55,2	29,6	9,9	5,8	4,3	7,2	2,1	3,9
wałeccki	97,9	48,4	21,2	7,9	5,4	6,3	2,2	1,5	5,0

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POWIATACH W 2010 ROKU

- wskaźnik na 10 tys. ludności



TABL. 1.8 **WYBRANE PRZYCZYNY ZGONÓW WEDŁUG PŁCI
W POWIATACH W 2010 ROKU**

Powiaty	Choroby układu krążenia			Nowotwory			Zewnętrzne przyczyny zgonu		
	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
WOJEWÓDZTWO 2010	7 405	3 625	3 780	4 468	2 499	1 969	1 129	867	262
m. Koszalin	384	199	185	328	169	159	56	39	17
m. Szczecin	1 833	887	946	1 163	617	546	236	162	74
m. Świnoujście	185	90	95	98	45	53	23	17	6
białogardzki	236	112	124	132	75	57	31	25	6
choszczeński	237	121	116	124	72	52	44	33	11
drawski	303	149	154	135	75	60	46	39	7
goleniowski	328	174	154	195	131	64	74	58	16
gryficki	283	139	144	169	92	77	46	34	12
gryfiński	384	186	198	210	128	82	64	49	15
kamieński	234	105	129	112	64	48	42	32	10
kołobrzeski	242	106	136	197	114	83	33	28	5
koszaliński	245	115	130	204	112	92	43	32	11
łobeski	193	89	104	94	54	40	31	25	6
myśliborski	322	164	158	147	90	57	38	32	6
policki	172	82	90	123	61	62	20	14	6
pyrzycki	191	96	95	102	65	37	21	14	7
ślawieński	264	123	141	150	91	59	39	29	10
stargardzki	476	237	239	301	170	131	86	75	11
szczecinecki	364	199	165	226	129	97	65	52	13
świdwiński	267	119	148	143	80	63	48	40	8
walecki	262	133	129	115	65	50	43	38	5

Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

TABL. 1.9 ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN I PŁCI W 2010 ROKU

Wyszczególnienie	Liczby bezwzględne			Wskaźnik na 10 tys. ludności		
	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
OGÓŁEM 2010	16 529	8 972	7 557	97,6	109,2	86,6
Choroby zakaźne i pasożytnicze	116	67	49	0,7	0,8	0,6
Nowotwory	4 468	2 499	1 969	26,4	30,4	22,6
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej	282	117	165	1,7	1,4	1,9
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania	59	50	9	0,3	0,6	0,1
Choroby układu nerwowego	162	75	87	1,0	0,9	1,0
Choroby układu krążenia	7 405	3 625	3 780	43,7	44,1	43,3
Choroby układu oddechowego	711	399	312	4,2	4,9	3,6
Choroby układu trawiennego	740	414	326	4,4	5,0	3,7
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej i skóry	12	2	10	0,1	0,02	0,1
Choroby układu moczowo-płciowego	245	115	130	1,4	1,4	1,5
Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	56	29	27	0,3	0,4	0,3
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	35	23	12	0,2	0,3	0,1
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych	1 098	687	411	6,5	8,4	4,7
Zewnętrzne przyczyny zgonu	1 129	867	262	6,7	10,6	3,0
Pozostałe przyczyny zgonów	11	3	8	0,1	0,04	0,1

Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

TABL. 1.10

GŁÓWNE PRZYCZYNY ZGONÓW W 2010 ROKU**MĘŻCZYŹNI**


Przyczyny zgonów	2010	
	liczba zgonów	% ogólnej liczby zgonów mężczyzn
Choroby układu krążenia	3 625	40,4
Nowotwory	2 499	27,9
Zewnętrzne przyczyny zgonu	867	9,7
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych	687	7,7
Choroby układu trawiennego	414	4,6
Choroby układu oddechowego	399	4,4
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej	117	1,3
Choroby układu moczowo-płciowego	115	1,3

KOBIETY


Przyczyny zgonów	2010	
	liczba zgonów	% ogólnej liczby zgonów kobiet
Choroby układu krążenia	3 780	50,0
Nowotwory	1 969	26,1
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych	411	5,4
Choroby układu trawiennego	326	4,3
Choroby układu oddechowego	312	4,1
Zewnętrzne przyczyny zgonu	262	3,5
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej	165	2,2
Choroby układu moczowo-płciowego	130	1,7

Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

GŁÓWNE PRZYCZYNY ZGONÓW W 2010 ROKU MĘŻCZYŹNI



GŁÓWNE PRZYCZYNY ZGONÓW W 2010 ROKU KOBIETY




TABL. 1.11 **ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG PRZYCZYN W 2010 ROKU**

Przyczyny zgonów	Liczby bezwzględne	W odsetkach	Wskaźnik na 1000 urodzeń żywych
WOJEWÓDZTWO 2010	91	100,0	5,2
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	56	61,5	3,2
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	27	29,7	1,6
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane	5	5,5	0,3
Choroby układu nerwowego	1	1,1	0,1
Choroby układu oddechowego	1	1,1	0,1
Choroby układu krążenia	1	1,1	0,1

Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

STRUKTURA ZGONÓW NIEMOWLĄT WEDŁUG PRZYCZYN W 2010 ROKU

- udział procentowy w ogólnej liczbie zgonów niemowląt




- niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
- wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
- objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane
- choroby układu nerwowego
- choroby układu oddechowego
- choroby układu krążenia

TABL. 1.12 ZGONY NIEMOWLĄT NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH

Lata	Polska	Województwo
2000	8,1	9,0
2001	7,7	8,9
2002	7,5	6,7
2003	7,0	7,8
2004	6,8	7,8
2005	6,4	7,1
2006	6,0	6,6
2007	6,0	7,4
2008	5,6	5,1
2009	5,6	6,7
2010	5,0	5,2
2011	4,7	6,1

Źródło: GUS Warszawa. Ludność, stan i struktura w przekroju terytorialnym




TABL.1.13 **ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2010 ROKU
WEDŁUG POWIATÓW**

Powiaty	Liczby bezwzględne			Wskaźnik na 100 tys. ludności	
	ogółem	mężczyźni	kobiety	mężczyźni	kobiety
WOJEWÓDZTWO 2010	4 305	2 419	1 886	294,5	216,3
m. Koszalin	314	167	147	325,8	258,8
m. Szczecin	1 126	597	529	310,2	247,8
m. Świnoujście	92	42	50	213,1	237,5
białogardzki	129	74	55	313,5	223,4
choszczeński	122	72	50	292,3	199,7
drawski	132	73	59	260,2	200,8
goleniowski	192	129	63	328,0	154,5
gryficki	158	88	70	295,9	226,8
gryfiński	198	121	77	295,0	184,3
kamieński	107	60	47	258,1	192,4
kołobrzeski	183	111	72	299,9	179,2
koszaliński	197	109	88	341,4	272,8
łobeski	85	47	38	251,8	196,8
myśliborski	147	90	57	272,7	167,5
policki	121	61	60	178,0	169,3
pyrzycki	98	64	34	322,7	169,5
ślawieński	145	88	57	313,6	194,7
stargardzki	288	162	126	277,9	206,3
szczecinecki	218	122	96	327,1	241,4
świdwiński	140	78	62	328,9	251,5
walecki	113	64	49	243,9	175,8

Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG POWIATÓW W 2010 ROKU**
- wskaźnik na 100 tys. ludności




**TABL.1.14 ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG PRZYCZYN
W POWIATACH W 2010 ROKU
liczby bezwzględne**

Powiaty	Zgony ogółem	W tym z powodu								
		now. złośliwy narządów trawiennych	now. złośliwy narządów oddechowych i klatki piersiowej	now. złośliwy sotka	now. złośliwy żeńskich narządów płc.	now. złośli. męskich narządów płc.	now. złośliwy układu moczowego	now. złośliwy niedokładnie określony i wtórny	now. złośli. tk. krwiotwórczej i limfatycznej	pozostałe
WOJEWÓDZTWO 2010	4 305	1 170	1 163	199	293	177	276	441	254	332
m. Koszalin	314	86	59	19	25	18	18	60	16	13
m. Szczecin	1 126	316	289	49	80	44	76	105	72	95
m. Świnoujście	92	28	26	9	7	2	3	10	4	3
białogardzki	129	43	33	4	11	5	11	9	4	9
choszczeński	122	36	47	6	3	3	1	15	3	8
drawski	132	38	45	8	7	4	9	11	6	4
goleniowski	192	60	59	6	10	10	16	11	8	12
gryficki	158	48	41	8	12	7	8	14	7	13
gryfiński	198	47	54	11	10	5	15	26	16	14
kamieński	107	25	28	1	9	6	9	8	11	10
kołobrzeski	183	38	57	5	16	12	10	23	8	14
koszaliński	197	40	54	10	15	4	10	29	17	18
łobeski	85	26	25	2	5	3	3	3	5	13
myśliborski	147	36	46	6	7	7	11	14	3	17
policki	121	36	27	7	8	1	5	16	8	13
pyrzycki	98	20	29	2	9	6	10	10	4	8
ślawieński	145	33	39	1	8	9	11	21	11	12
stargardzki	288	77	73	22	15	13	21	24	19	24
szczecinecki	218	64	64	15	15	11	13	10	15	11
świdwiński	140	42	36	6	7	4	9	18	6	12
walecki	113	31	32	2	14	3	7	4	11	9

Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

STRUKTURA ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2010 ROKU



- nowotwór złośliwy narządów trawiennych
- nowotwór złośliwy narządów oddechowych i klatki piersiowej
- nowotwór złośliwy sutka
- nowotwór złośliwy żeńskich narządów płciowych
- nowotwór złośliwy męskich narządów płciowych
- nowotwór złośliwy układu moczowego
- nowotwór złośliwy niedokładnie określony i wtórny
- nowotwór złośliwy tkanki krwiotwórczej i limfatycznej
- pozostałe nowotwory

**TABL.1.14.1 ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG PRZYCZYN
W POWIATACH W 2010 ROKU
wskaźnik na 100 tys. ludności**

Powiaty	Zgony ogółem	W tym z powodu								
		now. złośliwy narządów trawiennych	now. złośliwy narządów oddechowych i klatki piersiowej	now. złośliwy sutka	now. złośliwy żeńskich narządów płc.	now. złośliwy męskich narządów płc.	now. złośliwy układu moczowego	now. złośliwy nieodkładnie określony i wtórny	now. złośliw. tk. krwiotwórczej i limfatycznej	pozostałe
WOJEWÓDZTWO 2010	254,2	69,1	68,7	11,8	17,3	10,5	16,3	26,0	15,0	19,6
m. Koszalin	290,6	79,6	54,6	17,6	23,1	16,7	16,7	55,5	14,8	12,0
m. Szczecin	277,4	77,8	71,2	12,1	19,7	10,8	18,7	25,9	17,7	23,4
m. Świnoujście	225,7	68,7	63,8	22,1	17,2	4,9	7,4	24,5	9,8	7,4
białogardzki	267,5	89,2	68,4	8,3	22,8	10,4	22,8	18,7	8,3	18,7
choszczeński	245,6	72,5	94,6	12,1	6,0	6,0	2,0	30,2	6,0	16,1
drawski	229,8	66,2	78,3	13,9	12,2	7,0	15,7	19,2	10,4	7,0
goleniowski	239,7	74,9	73,6	7,5	12,5	12,5	20,0	13,7	10,0	15,0
gryficki	260,7	79,2	67,6	13,2	19,8	11,5	13,2	23,1	11,5	21,4
gryfiński	239,2	56,8	65,2	13,3	12,1	6,0	18,1	31,4	19,3	16,9
kamieński	224,4	52,4	58,7	2,1	18,9	12,6	18,9	16,8	23,1	21,0
kołobrzeski	237,1	49,2	73,8	6,5	20,7	15,5	13,0	29,8	10,4	18,1
koszaliński	306,9	62,3	84,1	15,6	23,4	6,2	15,6	45,2	26,5	28,0
łobeski	223,8	68,5	65,8	5,3	13,2	7,9	7,9	7,9	13,2	34,2
myśliborski	219,3	53,7	68,6	9,0	10,4	10,4	16,4	20,9	4,5	25,4
policki	173,6	51,6	38,7	10,0	11,5	1,4	7,2	23,0	11,5	18,6
pyrzycki	245,7	50,1	72,7	5,0	22,6	15,0	25,1	25,1	10,0	20,1
ślawieński	252,9	57,6	68,0	1,7	14,0	15,7	19,2	36,6	19,2	20,9
stargardzki	241,3	64,5	61,2	18,4	12,6	10,9	17,6	20,1	15,9	20,1
szczecinecki	282,9	83,0	83,0	19,5	19,5	14,3	16,9	13,0	19,5	14,3
świdwiński	289,5	86,8	74,4	12,4	14,5	8,3	18,6	37,2	12,4	24,8
walecki	208,8	57,3	59,1	3,7	25,9	5,5	12,9	7,4	20,3	16,6

TABL. 1.15 **ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2010 ROKU
WEDŁUG PRZYCZYN I PŁCI**

Przyczyny zgonów	Liczby bezwzględne			Wskaźnik na 100 tys.	
	ogółem	mężczyźni	kobiety	mężczyźni	kobiety
Nowotwory złośliwe razem	4 305	2 419	1 886	294,5	216,3
Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła	114	82	32	10,0	3,7
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych w tym:	1 170	653	517	79,5	59,3
- przełyku	65	53	12	6,5	1,4
- żołądka	214	144	70	17,5	8,0
- jelita grubego, zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy i odbytu	487	275	212	33,5	24,3
- wątroby, przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych i pęcherzyka żółciowego	161	67	94	8,2	10,8
- trzustki	209	97	112	11,8	12,8
Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej w tym:	1 163	813	350	99,0	40,1
- krtani	53	52	1	6,3	0,1
- oskrzela i płuca	1 090	752	338	91,6	38,8
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej	14	11	3	1,3	0,3
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry w tym:	58	34	24	4,1	2,8
- czerniak złośliwy	40	22	18	2,7	2,1
Nowotwory złośliwe międzybłonna i tkanek miękkich	30	15	15	1,8	1,7
Nowotwór złośliwy sutka	199	3	196	0,4	22,5
Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych w tym:	293	x	293	x	33,6
- szyjki macicy	89	x	89	x	10,2
- trzonu macicy	39	x	39	x	4,5
- jajnika	138	x	138	x	15,8
Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych w tym:	177	177	x	21,5	x
- gruczołu krokowego	166	166	x	20,2	x

cd. TABL. 1.15 **ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W ROKU 2010**
WEDŁUG PRZYCZYN I PŁCI

Przyczyny zgonów	Liczby bezwzględne			Wskaźnik na 100 tys.	
	ogółem	mężczyźni	kobiety	mężczyźni	kobiety
Nowotwory złośliwe układu moczowego w tym:	276	205	71	25,0	8,1
- pęcherza moczowego	161	125	36	15,2	4,1
- nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	104	74	30	9,0	3,4
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części CSN w tym:	108	48	60	5,8	6,9
- mózgu	95	43	52	5,2	6,0
Nowotwór złośliwy tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego	8	6	2	0,7	0,2
Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	441	234	207	28,5	23,7
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych w tym:	254	138	116	16,8	13,3
- choroba Hodgkina	7	4	3	0,5	0,3
- szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	61	34	27	4,1	3,1
- chłoniaki nieziarnicze	72	43	29	5,2	3,3
- białaczka	109	55	54	6,7	6,2

Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie



TABL. 1.16

**WYBRANE PRZYCZYNY ZGONÓW
NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2010 ROKU**

Przyczyna	Ogółem		Mężczyźni		Kobiety	
	liczba zgonów	% ogólnej liczby zgonów	liczba zgonów	% liczby zgonów mężczyzn	liczba zgonów	% liczby zgonów kobiet
Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	1 090	25,3	752	31,1	338	17,9
Nowotwór złośliwy jelita grubego, zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy i odbytu	487	11,3	275	11,4	212	11,2
Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	441	10,2	234	9,7	207	11,0
Nowotwór złośliwy żołądka	214	5,0	144	6,0	70	3,7
Nowotwór złośliwy trzustki	209	4,9	97	4,0	112	5,9
Nowotwór złośliwy sutka	199	4,6	3	0,1	196	10,4
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	166	3,9	166	6,9	x	x
Nowotwór złośliwy wątroby, przewodów wewnątrzwątrobowych i pęcherzyka żółciowego	161	3,7	67	2,8	94	5,0
Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	161	3,7	125	5,2	36	1,9
Nowotwór złośliwy jajnika	138	3,2	x	x	138	7,3

Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

WYBRANE PRZYCZYNY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2010 ROKU - udział procentowy




- nowotwór złośliwy oskrzela i płuca
- nowotwór złośliwy jelita grubego, zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy i odbytu
- nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu
- nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
- nowotwór złośliwy żołądka
- nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
- nowotwór złośliwy trzustki
- nowotwór złośliwy wątroby, przewodów wewnątrzwątrobowych i pęcherzyka żółciowego
- nowotwór złośliwy sutka
- nowotwór złośliwy jajnika

**TABL. 1.17 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2009 ROKU
WEDŁUG POWIATÓW**

Powiaty	Liczby bezwzględne			Wskaźnik na 100 tys. ludności	
	ogółem	mężczyźni	kobiety	mężczyźni	kobiety
WOJEWÓDZTWO 2009	5 098	2 438	2 660	296,7	305,2
m. Koszalin	343	174	169	341,7	300,2
m. Szczecin	1 438	681	757	353,3	354,3
m. Świnoujście	133	62	71	313,5	336,9
białogardzki	145	74	71	313,5	287,3
choszczeński	156	75	81	303,9	323,1
drawski	146	68	78	242,3	265,4
goleniowski	267	122	145	311,3	356,9
gryficki	190	86	104	288,5	336,9
gryfiński	222	118	104	286,7	248,0
kamieński	142	67	75	287,1	306,8
kołobrzeski	242	119	123	322,8	307,7
koszaliński	184	85	99	263,7	303,5
łobeski	112	51	61	272,3	314,5
myśliborski	157	73	84	220,4	246,4
policki	153	71	82	210,8	235,8
pyrzycki	92	41	51	206,3	253,4
sławieński	167	91	76	323,9	260,1
stargardzki	350	156	194	267,7	317,8
szczecinecki	209	99	110	265,4	277,3
świdwiński	125	73	52	306,3	210,5
wałeccki	125	52	73	197,7	261,0

Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG
POWIATÓW W 2009 ROKU**
- wskaźnik na 100 tys. ludności



**TABL. 1.18 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2009 ROKU
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI**

Wyszczególnienie	Liczby bezwzględne			Wskaźniki na 100 tys. ludności	
	ogółem	mężczyźni	kobiety	mężczyźni	kobiety
WOJEWÓDZTWO 2009	5 098	2 438	2 660	296,7	305,2
Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła	143	106	37	12,9	4,2
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych w tym:	1 097	574	523	69,9	60,0
- odbytnicy i odbytu	244	126	118	15,3	13,5
- jelita grubego i jelita cienkiego	332	164	168	20,0	19,3
- żołądka	205	132	73	16,1	8,4
- trzustki	111	48	63	5,8	7,2
- przełyku	51	41	10	5,0	1,1
- wątroby, przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych i pęcherzyka żółciowego	100	39	61	4,7	7,0
- zgięcia esiczo-odbytniczego i innych niedokładnie określ. narządów trawiennych	39	19	20	2,3	2,3
Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej w tym:	1 050	729	321	88,7	36,8
- oskrzela i płuca	960	660	300	80,3	34,4
- krtani, tchawicy i j. nosowej	74	60	14	7,3	1,6
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej	19	14	5	1,7	0,6
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry w tym:	297	122	175	14,8	20,1
- czerniak złośliwy	127	50	77	6,1	8,8
Nowotwory złośliwe międzybłonna i tkanek miękkich	40	25	15	3,0	1,7
Nowotwór złośliwy sutka	699	4	695	0,5	79,7
Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych w tym:	436	x	436	x	50,0
- szyjki macicy	117	x	117	x	13,4
- trzonu macicy	182	x	182	x	20,9
- jajnika	114	x	114	x	13,1
- innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	1	x	1	x	0,1
Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych w tym:	337	337	x	41,0	x
- gruczołu krokowego	291	291	x	35,4	x
- jądra i prącia	46	46	x	5,6	x

cd. TABL. 1.18 **ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2009 ROKU
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI**

Wyszczególnienie	Liczby bezwzględne			Wskaźniki na 100 tys. ludności	
	ogółem	mężczyźni	kobiety	mężczyźni	kobiety
Nowotwory złośliwe układu moczowego w tym:	279	199	80	24,2	9,2
- pęcherza moczowego	170	126	44	15,3	5,0
- nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	104	72	32	8,8	3,7
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części CSN w tym:	118	63	55	7,7	6,3
- mózgu	109	60	49	7,3	5,6
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego	78	20	58	2,4	6,7
Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	207	115	92	14,0	10,6
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych w tym:	237	125	112	15,2	12,8
- choroba Hodgkina	24	18	6	2,2	0,7
- chłoniaki nieziarnicze	101	47	54	5,7	6,2
- szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	37	17	20	2,1	2,3
- białaczka	69	39	30	4,7	3,4
Nowotwory złośliwe niezależnych mnogich umiejscowień i in situ	61	5	56	0,6	6,4

Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów


TABL.1.19 ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE

Wyszczególnienie	Województwo zachodniopomorskie				Wskaźnik krajowy na 100 tys. ludności ^{1/}	
	liczby bezwzględne		wskaźnik na 100 tys. ludności			
	2010	2011	2010	2011	2010	2011 ^{2/}
Bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	590	632	34,8	37,3	30,0	28,4
w tym salmonellozy	372	330	22,0	19,5	25,0	22,7
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	143	121	8,4	7,1	16,7	17,1
Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	1 233	2 593	72,8	153,1	85,7	117,6
Biegunka i zapalenie żołądkowo- jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu (ogółem)	438	1 783	25,9	105,3	68,9	92,2
Biegunki u dzieci do lat 2 ^{3/}	826	1321	2 303,0	3 683,1	3 603,9	4 375,6
Lamblioza (giardioza)	43	52	2,5	3,1	6,2	4,5
Mikobakteriozy – inne i BNO	-	21	-	1,24	0,25	0,36
Krztusiec	12	45	0,7	2,66	3,32	4,37
Szkarlatyna (płonica)	639	701	37,7	41,4	36,5	47,8
Róża	67	190	4,0	11,2	8,2	9,0
Borelioza z Lyme (krętkowica kleszczowa)	255	242	15,1	14,3	23,6	24,0
Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień	341	343	20,1	20,3	19,7	20,5
Wirusowe zapalenie mózgu	13	13	0,8	0,77	1,25	1,11
w tym kleszczowe zapalenie mózgu	1	3	0,06	0,18	0,77	0,58
Wirusowe zapalenie opon mózgowych (ogółem)	52	60	3,1	3,54	3,1	2,74
Ospa wietrzna	6 347	7 650	374,8	451,7	480,4	452,7
Różyczka	178	394	10,5	23,3	11,0	11,2
Wirusowe zapalenie wątroby ^{4/}	86	104	5,1	6,1	10,5	10,1
w tym wzv typu B	30	35	1,8	2,07	4,28	4,15
AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności	2	27	0,12	1,59	0,41	0,63
Nowo wykryte zakażenia HIV	41	45	2,4	2,66	2,00	3,16
Świnka (nagminne zapalenie przyusznic)	105	102	6,2	6,0	7,2	6,8
Malaria (zimnica)	10	2	0,6	0,12	0,09	0,04
Grypa i podejrzenia zachorowań na grypę	12 401	21 991	732,3	1 298,5	1 443,0	3 027,9
w tym u dzieci (0 - 14 lat) ^{5/}	5 512	8 194	2 180,0	3 240,7	4 200,7	8 656,8

Źródło: sprawozdanie MZ-56, MZ-55

^{1/} wskaźnik krajowy na 100 tys. ludności wg NIZP-PZH Warszawa^{2/} wstępne dane^{3/} wskaźnik na 100 tys. populacji w grupie wiekowej 0 - 2 lat^{4/} wzv typu C wg definicji z 2009 r.^{5/} wskaźnik na 100 tys. populacji w grupie wiekowej 0 - 14 lat

ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE W 2011 R. - wskaźnik na 100 tys. ludności



TABL. 1.20 **ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE**

Wyszczególnienie	Iła ogółem	Z tego			Rzeżączka
		wrodzona	wczesna	późna inna i nieokreślona	
WOJEWÓDZTWO					
2010	39	-	36	3	10
2011	39	-	37	2	4
Wskaźnik na 100 tys. ludności					
2010	2,3	-	2,1	0,2	0,6
2011	2,3	-	2,2	0,1	0,2

Źródło: sprawozdanie MZ-14

TABL. 1.21

CHORZY ZAREJESTROWANI NA GRUŻLICĘ

(stan w dniu 31.12.2011 r.)

Wyszczególnienie	Gruźlica				
	wszystkie postacie	w tym			
		płucna			pozapłucna
		razem	zakaźna	niezakaźna	
WOJEWÓDZTWO					
2010	315	296	234	62	19
2011	323	305	249	56	18
Wskaźnik na 100 tys. ludności					
2010	18,6	17,5	13,8	3,7	1,1
2011	19,1	18,0	14,7	3,3	1,1

Źródło: sprawozdanie MZ-13

TABL. 1.22

NOWE ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ

Wyszczególnienie		Gruźlica				
		wszystkie postacie	w tym			
			płucna			innych narządów
			razem	zakaźna	niezakaźna	
WOJEWÓDZTWO 2010		260	245	192	53	15
2011		322	302	228	74	20
w tym:	Miasto					

Źródło: Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie


**TABL. 1.23 LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH W 2011 ROKU
(bez uzależnień)**

Wyszczególnienie			Leczeni		W tym leczeni ogółem w wieku lat				Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu		W tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat			
			ogółem	w tym mężczyźni	0-18	19-29	30-64	65 lat i więcej	ogółem	w tym mężczyźni	0-18	19-29	30-64	65 lat i więcej
Ogółem z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) (suma wierszy 5-21 bez wiersza 16)		1	44 434	18 059	3 105	7 610	26 410	7 309	12 197	4 964	1 670	2 329	6 621	1 577
Z wiersza 1	mężczyźni	2			2 005	3 196	10 245	2 613			1 043	1 001	2 389	531
	osoby zamieszkałe na wsi	3	9 459	4 206	403	2 110	5 345	1 601	1 967	866	220	482	1 022	243
	opieka czynna	4	11 736	4 948	567	1 807	6 809	2 553	2 957	1 179	316	653	1 535	453
Według rozpoznania zasadniczego	organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00, F01, F02, F04, F07, F08, F09)	5	4 423	2 327	10	304	2 351	1 758	1 113	495	8	123	534	448
	organiczne zaburzenia psychotyczne (F03, F05, F06)	6	3 766	1 554	4	181	1 960	1 621	872	349	3	62	415	392
	schizofrenia (F20)	7	5 935	2 689	47	1 068	4 117	703	530	242	27	173	284	46
	inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21 - F29)	8	1 222	523	19	189	798	216	186	86	4	44	106	32
	epizody afektywne (F30 i F32)	9	3 414	1 102	82	527	2 206	599	875	316	52	131	588	104
	depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33)	10	3 133	1 150	40	505	2 035	553	488	182	26	97	295	70
	inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34 - F39)	11	1 178	378	27	136	868	147	242	75	12	41	163	26
	zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40 - F48)	12	14 008	4 242	477	2 717	9 387	1 427	5 136	1 636	228	1 070	3 450	388
	zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50)	13	269	30	90	125	51	3	147	22	49	77	21	-
	inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51 - F59)	14	216	92	29	33	121	33	90	41	12	15	50	13
	zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60 - F69)	15	1 694	881	18	622	945	109	477	254	13	201	239	24
	w tym patologiczny hazard (F63.0)	16	70	57	-	42	28	-	26	24	-	14	12	-
	upośledzenie umysłowe (F70 - F79)	17	2 310	1 305	561	639	1 053	57	634	343	206	169	253	6
	całościowe zaburzenia rozwojowe (F84)	18	402	289	199	199	4	-	116	103	111	5	-	-
	pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88, F89)	19	174	128	130	31	13	-	61	41	44	16	1	-
	zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (F90 - F98)	20	1 544	1 052	1 295	204	42	3	846	609	814	28	4	-
	nieokreślone zaburzenia psychiczne	21	746	317	77	130	459	80	384	170	61	77	218	28
Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne		22	226	109	28	82	104	12	172	86	23	70	70	9

Źródło: sprawozdanie MZ-15

Uwaga: nie uwzględnia się leczonych w poradniach psychologicznych

**LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH
BEZ UZALEŻNIEŃ
W LATACH 2010-2011
liczby bezwzględne**



TABL. 1.23.1

**WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE LECZONYCH
Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH W 2011 ROKU
(bez uzależnień)**

Wyszczególnienie			Leczeni ogółem			W tym leczeni po raz pierwszy w życiu			
			w liczbach bezwzględnych	w odsetkach	na 100 tys. ludności	w liczbach bezwzględnych	w odsetkach	na 100 tys. ludności	
Ogółem z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) (suma wierszy 5-21 bez wiersza 16)			1	44 434	100,0	2 623,8	12 197	100,0	720,2
Z wiersza 1	mężczyźni	2	18 059	40,6	2 198,6	4 964	40,7	604,3	
	osoby zamieszkałe na wsi	3	9 459	21,3	1 793,5	1 967	16,1	373,0	
	opieka czynna	4	11 736	26,4	693,0	2 957	24,2	174,6	
Według rozpoznania zasadniczego	organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00, F01, F02, F04, F07, F08, F09)	5	4 423	10,0	261,2	1 113	9,1	65,7	
	organiczne zaburzenia psychotyczne (F03, F05, F06)	6	3 766	8,5	222,4	872	7,2	51,5	
	schizofrenia (F20)	7	5 935	13,3	350,5	530	4,3	31,3	
	inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21-F29)	8	1 222	2,7	72,2	186	1,5	11,0	
	epizody afektywne (F30 i F32)	9	3 414	7,7	201,6	875	7,2	51,7	
	depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 iF33)	10	3 133	7,1	185,0	488	4,0	28,8	
	inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34 - F39)	11	1 178	2,6	69,6	242	2,0	14,3	
	zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40 - F48)	12	14 008	31,5	827,2	5 136	42,1	303,3	
	zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50)	13	269	0,6	15,9	147	1,2	8,7	
	inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51-F59)	14	216	0,5	12,8	90	0,7	5,3	
	zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)	15	1 694	3,8	100,0	477	3,9	28,2	
	w tym patologiczny hazard (F63.0)	16	70	0,2	4,1	26	0,2	1,5	
	upośledzenie umysłowe (F70 - F79)	17	2 310	5,2	136,4	634	5,2	37,4	
	całościowe zaburzenia rozwojowe (F84)	18	402	0,9	23,7	116	1,0	6,8	
	pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88, F89)	19	174	0,4	10,3	61	0,5	3,6	
	zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (F90-F98)	20	1 544	3,5	91,2	846	6,9	50,0	
	nieokreślone zaburzenia psychiczne	21	746	1,7	44,1	384	3,2	22,7	
Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne		22	226	0,5	13,3	172	1,4	10,2	

Źródło: sprawozdanie MZ-15

Uwaga: nie uwzględnia się leczonych w poradniach psychologicznych


cd. TABL. 1. 24

LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ SPOWODOWANYCH UŻYWANIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W 2011 ROKU

Wyszczególnienie				Leczeni		W tym leczeni ogółem w wieku lat				Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu		W tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat				Zobowiązani do leczenia
				ogółem	w tym mężczyźni	0-18	19-29	30-64	65 i więcej	ogółem	w tym mężczyźni	0-18	19-29	30-64	65 i więcej	
Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych	Subst. halucynogenne (F16)	ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F16.0, F16.1)	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F16.2, F16.3)	24	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		zaburzenia psychiatryczne (F16.4, F16.5, F16.6)	25	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		inne (F16.7, F16.8, F16.9)	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lodne rozpuszczalniki (F18)	ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F18.0, F18.1)	27	7	5	1	1	5	-	2	1	-	-	2	-	-
		zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F18.2, F18.3)	28	9	8	-	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		zaburzenia psychiatryczne (F18.4, F18.5, F18.6)	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		inne (F18.7, F18.8, F18.9)	30	11	8	-	8	3	-	2	1	-	2	-	-	-
	Kilka subst. lub inne subst. psychoakt. (F19)	ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F19.0, F19.1)	31	195	140	50	82	59	4	114	67	35	34	41	4	17
		zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F19.2, F19.3)	32	528	427	31	283	212	2	196	162	16	129	51	-	27
		zaburzenia psychiatryczne (F19.4, F19.5, F19.6)	33	31	30	1	23	7	-	10	10	1	8	1	-	3
		inne (F19.7, F19.8, F19.9)	34	52	35	-	20	30	2	11	10	-	8	3	-	-
	Używanie tytoniu (F17)		35	14	10	3	2	6	3	6	5	3	1	2	-	-
	Współistniejące uzależnienia od alkoholu		36	219	179	-	53	151	15	53	41	-	9	41	3	2
	Współuzależnienia		37	19	3	-	3	16	-	11	2	-	1	10	-	2

Źródło: sprawozdanie MZ-15

**LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ SPOWODOWANYCH
UŻYWANIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
W LATACH 2010-2011
liczby bezwzględne**



TABL. 1. 24.1 WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE LECZONYCH Z POWODU ZABURZEŃ SPOWODOWANYCH UŻYCIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W 2011 ROKU

Wyszczególnienie			Leczeni ogółem			W tym leczeni po raz pierwszy w życiu		
			w liczbach bezwzględnych	w odsetkach	na 100 tys. ludności	w liczbach bezwzględnych	w odsetkach	na 100 tys. ludności
Ogółem z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych (suma wierszy 4-35)		1	1 782	100,0	105,2	689	100,0	40,7
Z wiersza 1	mężczyźni	2	1 186	66,6	144,4	422	61,2	51,4
	osoby zamieszkałe na wsi	3	238	13,4	45,1	95	13,8	18,0
Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych	Opiaty (F11)	ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F11.0, F11.1)	4	16	0,9	5	0,7	0,3
		zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F11.2, F11.3)	5	95	5,3	16	2,3	0,9
		inne (F11.7, F11.8, F11.9)	6	3	0,2	1	0,1	0,1
	Kanabinoły (F12)	ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F12.0, F12.1)	7	127	7,1	73	10,6	4,3
		zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F12.2, F12.3)	8	61	3,4	26	3,8	1,5
		zaburzenia psychiczne (F12.4, F12.5, F12.6)	9	25	1,4	10	1,5	0,6
		inne (F12.7, F12.8, F12.9)	10	-	-	-	-	-
	Leki uspokajające i nasenne (F13)	ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F13.0, F13.1)	11	150	8,4	36	5,2	2,1
		zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F13.2, F13.3)	12	287	16,1	114	16,5	6,7
		zaburzenia psychiczne (F13.4, F13.5, F13.6)	13	2	0,1	-	-	-
		inne (F13.7, F13.8, F13.9)	14	46	2,6	8	1,2	0,5
	Kokaina (F14)	ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F14.0, F14.1)	15	-	-	-	-	-
		zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F14.2, F14.3)	16	4	0,2	4	0,6	0,2
		zaburzenia psychiczne (F14.4, F14.5, F14.6)	17	8	0,5	2	0,3	0,1
		inne (F14.7, F14.8, F14.9)	18	-	-	-	-	-
	Inne substancje pobudzające w tym kofeina (F15)	ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F15.0, F15.1)	19	45	2,5	23	3,3	1,4
		zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F15.2, F15.3)	20	42	2,4	17	2,5	1,0
		zaburzenia psychiczne (F15.4, F15.5, F15.6)	21	19	1,1	13	1,9	0,8
		inne (F15.7, F15.8, F15.9)	22	1	0,1	-	-	-

cd. TABL. 1.24.1 **WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE LECZONYCH Z POWODU ZABURZEŃ SPOWODOWANYCH UŻYCIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W 2011 ROKU**

Wyszczególnienie				Leczeni ogółem			W tym leczeni po raz pierwszy w życiu		
				w liczbach bezwzględnych	w odsetkach	na 100 tys. ludności	w liczbach bezwzględnych	w odsetkach	na 100 tys. ludności
Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych	Substancje halucynogenne (F16)	ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F16.0, F16.1)	23	-	-	-	-	-	-
		zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F16.2, F16.3)	24	2	0,1	0,1	-	-	-
		zaburzenia psychotyczne (F16.4, F16.5, F16.6)	25	2	0,1	0,1	-	-	-
		inne (F16.7, F16.8, F16.9)	26	-	-	-	-	-	-
	Lecne rozpuszczalniki (F18)	ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F18.0, F18.1)	27	7	0,4	0,4	2	0,3	0,1
		zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F18.2, F18.3)	28	9	0,5	0,5	-	-	-
		zaburzenia psychotyczne (F18.4, F18.5, F18.6)	29	-	-	-	-	-	-
		Inne (F18.7, F18.8, F18.9)	30	11	0,6	0,6	2	0,3	0,1
	Kilka subst. lub inne subst. psychoaktywne (F19)	ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F19.0, F19.1)	31	195	10,9	11,5	114	16,5	6,7
		zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F19.2, F19.3)	32	528	29,6	31,2	196	28,4	11,6
		zaburzenia psychotyczne (F19.4, F19.5, F19.6)	33	31	1,8	1,8	10	1,5	0,6
		inne (F19.7, F19.8, F19.9)	34	52	2,9	3,1	11	1,6	0,6
	Używanie tytoniu (F17)		35	14	0,8	0,8	6	0,9	0,4
Współistniejące uzależnienia od alkoholu		36	219	12,3	12,9	53	7,7	3,1	
Współuzależnienia		37	19	1,1	1,1	11	1,6	0,6	


Źródło: sprawozdanie MZ-15

**TABL. 1. 25 LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ SPOWODOWANYCH
UŻYCIEM ALKOHOLU W 2011 ROKU**

Wyszczególnienie			Leczeni		W tym leczeni ogółem w wieku lat				Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu		W tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat				Z kolumny 1 zobowiązani do leczenia odwykowego	
			ogółem	w tym mężczyźni	0-18	19-29	30-64	65 i więcej	ogółem	w tym mężczyźni	0-18	19-29	30-64	65 i więcej		
Ogółem z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu (suma wierszy 5-12)		1	8 806	6 784	17	1 129	7 326	334	3 579	2 562	13	540	2 896	130	1 112	
Z wiersza 1	mężczyźni	2				13	795	5 724	252			12	420	2 036	94	904
	osoby zamieszkałe na wsi	3	1 719	1 326	6	248	1 382	83	629	462	4	121	474	30	257	
	opieka czynna	4	5 334	4 134	7	702	4 477	148	2 271	1 539	3	344	1 858	66	792	
Według rozpoznania zasadniczego	Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu	ostre zatrucie (F10.0)	5	996	791	1	125	807	63	358	286	-	61	269	28	158
		używanie szkodliwe (F10.1)	6	674	401	11	129	507	27	299	191	9	68	211	11	16
		zespół uzależnienia (F10.2)	7	5 932	4 660	3	697	5 079	153	2 389	1 674	3	339	1 992	55	899
		zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)	8	833	651	2	115	670	46	430	339	1	58	354	17	14
		zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)	9	44	35	-	5	33	6	20	15	-	2	13	5	2
		zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5)	10	104	81	-	23	67	14	29	23	-	5	17	7	20
		zespół amnestyczny (F10.6)	11	27	20	-	3	12	12	14	11	-	1	7	6	-
		inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9)	12	196	145	-	32	151	13	40	23	-	6	33	1	3
	Współistniejące uzależnienie od środków psychoaktywnych (F11-F19)		13	361	233	2	108	226	25	135	88	1	69	57	8	19
Współuzależnienia		14	1 576	217	1	423	1 108	44	803	130	1	239	538	25	-	

Źródło: sprawozdanie MZ-15

**LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ SPOWODOWANYCH
UŻYWANIEM ALKOHOLU
W LATACH 2010-2011
liczby bezwzględne**



**TABL. 1.25.1 WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE LECZONYCH Z POWODU ZABURZEŃ
SPOWODOWANYCH UŻYCIEM ALKOHOLU
W 2011 ROKU**

Wyszczególnienie			Leczeni ogółem			W tym leczeni po raz pierwszy w życiu			
			w liczbach bezwzględnych	w odsetkach	na 100 tys. ludności	w liczbach bezwzględnych	w odsetkach	na 100 tys. ludności	
Ogółem z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu (suma wierszy 5-12)			1	8 806	100,0	520,0	3 579	100,0	211,3
Z wiersza 1	mężczyźni	2	6 784	77,0	825,9	2 562	71,6	311,9	
	osoby zamieszkałe na wsi	3	1 719	19,5	325,9	629	17,6	119,3	
	opieka czynna	4	5 334	60,6	315,0	2 271	63,5	134,1	
Według rozpoznania zasadniczego	Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu	ostre zatrucie (F10.0)	5	996	11,3	58,8	358	10,0	21,1
		używanie szkodliwe (F10.1)	6	674	7,7	39,8	299	8,4	17,7
		zespół uzależnienia (F10.2)	7	5 932	67,4	350,3	2 389	66,8	141,1
		zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)	8	833	9,4	49,2	430	12,0	25,4
		zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)	9	44	0,5	2,6	20	0,5	1,2
		zaburzenia psychiczne bez majaczenia (F10.5)	10	104	1,2	6,1	29	0,8	1,7
		zespół amnestyczny (F10.6)	11	27	0,3	1,6	14	0,4	0,8
		inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9)	12	196	2,2	11,6	40	1,1	2,4
Współistniejące uzależnienie od środków psychoaktywnych (F11-F19)		13	361	4,1	21,3	135	3,8	8,0	
Współuzależnienia		14	1 576	17,9	93,1	803	22,4	47,4	

Źródło: sprawozdanie MZ-15

