

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -285/2025d z dnia 15.04.2025 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-49/2020wu z dnia 29.12.2020 r.

Posiadacz zezwolenia:

Detia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11 D-69514 Laudenbach, Republika Federalna
Niemiec, tel.+49 06201/708-0

ARVALIN

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

fosforek cynku - 25 g/kg (25 %)

Zezwolenie MRiRW nr R-49/2020wu z dnia 29.12.2020 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 285/2025d z dnia 15.04.2025 r.

	
Uwaga	
H302 H410	Działa szkodliwie po połknięciu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 032 EUH 401	W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy. W celu uniknięcia ryzyka dla ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.
P280 P301 + P312 + P330	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub lekarzem. Wypłukać usta. Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA

RODENTYCYD o działaniu żołądkowym w formie przynęty gotowej do użycia (RB) w postaci ziarna. Przeznaczony do zwalczania gryzoni w uprawie roślin, na użytkach zielonych i terenach leśnych.

Po spożyciu środka, w żołądku gryzonia pod wpływem kwasu żołądkowego fosforek cynku ulega rozkładowi tworząc fosfinę (fosforowodór). Fosfina jest bardzo silną trucizną metaboliczną i nerwową.

STOSOWANIE ŚRODKA

Uprawy rolnicze

nornik polny

a) Umieszczenie przynęty w norze

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha

Termin i sposób stosowania: w trakcie zasiedlania uprawy przez gryzonie (na dowolnym etapie) należy umieścić po 5 granul środka do każdej nory.

b) Stacja deratyzacyjna

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha

Termin i sposób stosowania: w trakcie zasiedlania uprawy przez gryzonie (na dowolnym etapie) należy zastosować 50 g środka na stanowisko.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (3 – w przypadku zastosowania w formie dawki dzielonej).

Rośliny warzywne (w uprawie polowej)

nornik polny

a) Umieszczenie przynęty w norze

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha

Termin i sposób stosowania: w trakcie zasiedlania uprawy przez gryzonie (na dowolnym etapie) należy umieścić po 5 granul środka do każdej nory.

b) Stacja deratyzacyjna

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha

Termin i sposób stosowania: w trakcie zasiedlania uprawy przez gryzonie (na dowolnym etapie) należy zastosować 50 g środka na stanowisko.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (3 – w przypadku zastosowania w formie dawki dzielonej).

Rośliny sadownicze (w uprawie polowej)

nornik polny

a) Umieszczenie przynęty w norze

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha

Termin i sposób stosowania: w trakcie zasiedlania uprawy przez gryzonie (na dowolnym etapie) należy umieścić po 5 granul środka do każdej nory.

b) Stacja deratyzacyjna

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha

Termin i sposób stosowania: w trakcie zasiedlania uprawy przez gryzonie (na dowolnym etapie) należy zastosować 50 g środka na stanowisko.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (3 – w przypadku zastosowania w formie dawki dzielonej).

Winorośl

nornik polny

a) Umieszczenie przynęty w norze

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha

Termin i sposób stosowania: w trakcie zasiedlania uprawy przez gryzonie (na dowolnym etapie) należy umieścić po 5 granul środka do każdej nory.

b) Stacja deratyzacyjna

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha

Termin i sposób stosowania: w trakcie zasiedlania uprawy przez gryzonie (na dowolnym etapie) należy zastosować 50 g środka na stanowisko.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (3 – w przypadku zastosowania w formie dawki dzielonej).

Rośliny ozdobne (w uprawie polowej)

nornik polny

a) Umieszczenie przynęty w norze

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha

Termin i sposób stosowania: w trakcie zasiedlania uprawy przez gryzonie (na dowolnym etapie) należy umieścić po 5 granul środka do każdej nory.

b) Stacja deratyzacyjna

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha

Termin i sposób stosowania: w trakcie zasiedlania uprawy przez gryzonie (na dowolnym etapie) należy zastosować 50 g środka na stanowisko.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (3 – w przypadku zastosowania w formie dawki dzielonej).

Użytki zielone

nornik polny

a) Umieszczenie przynęty w norze

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha

Termin i sposób stosowania: w trakcie zasiedlania uprawy przez gryzonie (na dowolnym etapie) należy umieścić po 5 granul środka do każdej nory.

b) Stacja deratyzacyjna

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha

Termin i sposób stosowania: w trakcie zasiedlania uprawy przez gryzonie (na dowolnym etapie) należy zastosować 50 g środka na stanowisko.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (3 – w przypadku zastosowania w formie dawki dzielonej).

Tereny leśne

nornik polny

a) Umieszczenie przynęty w norze

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha

Termin i sposób stosowania: w trakcie zasiedlania uprawy przez gryzonie (na dowolnym etapie) należy umieścić po 5 granul środka do każdej nory.

b) Stacja deratyzacyjna

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha

Termin i sposób stosowania: w trakcie zasiedlania uprawy przez gryzonie (na dowolnym etapie) należy zastosować 50 g środka na stanowisko.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (3 – w przypadku zastosowania w formie dawki dzielonej).

SPOSÓB STOSOWANIA ŚRODKA

Środek należy umieścić w dawce po 5 ziaren/granul na każdą norę, zawsze głęboko i w sposób niedostępny dla zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania, w tym ptaków lub po 50 g na jedną stację deratyzacyjną. W przypadku umieszczania środka w norze upewnić się, że jest ona zamieszkała przez gryzonie.

Przynęta musi być umieszczona głęboko w korytarzach/norach dla gryzoni, za pomocą dostępnego w handlu aplikatora lub z użyciem stacji deratyzacyjnej. Środek nie może pozostać na powierzchni.

Stosowane stacje deratyzacyjne (pułapki) muszą być stabilne mechanicznie, odporne na warunki atmosferyczne i manipulacje. Muszą być one zaprojektowane i ustawione w taki sposób, aby były w możliwie jak najmniejszym stopniu dostępne dla zwierząt niebędących celem zwalczania. Rozmiar średnicy przejścia dla gryzoni może wynosić maksymalnie 6 cm.

Stacje muszą być wyraźnie i czytelnie oznakowane etykietą ostrzegawczą o następującej treści: „Uwaga! Trutka na myszy, substancja czynna: 25 g/kg fosforu cynku, trzymać z dala dzieci i zwierząt domowych”.

Martwe gryzonie usuwać natychmiast, w celu uniknięcia wtórnego zatrucia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Środek należy stosować wyłącznie w przypadku, gdy za pomocą odpowiedniej metody prognozowania/monitorowania uzasadniona jest dostatecznie konieczność zastosowania zabiegu chemicznego w celu zwalczania szkodników (gryzoni).

Dopuszczone jest stosowanie środka w dawkach dzielonych (trzy zabiegi po 0,66 (0,22) kg na 1 ha), dopóki przynęta jest spożywana (suma dawek dzielonych nie może przekroczyć zalecanej maksymalnej dawki dla jednorazowego zastosowania).

Środek jest toksyczny dla zwierząt. Należy stosować go, tak aby nie był on dostępny dla ptaków i innych zwierząt.

Nie rozsypywać środka na powierzchni gleby.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przynętę należy rozkładać w taki sposób, aby była ona niedostępna dla dzieci oraz zwierząt domowych i dzikich zwierząt.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie rozkładania środka i utylizacji pozostałej przynęty oraz czyszczenia pułapek na przynętę.

Unikać każdego niepotrzebnego kontaktu ze środkiem.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie dotyczy

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony zwierząt niebędących celem działania środka przynętę należy umieszczać głęboko w norach (np. przy pomocy pistoletów do aplikacji przynęt). Zabrania się aplikacji środka polegającej na rozrzucaniu lub rozsypywaniu przynęt na ochranianym terenie.

Nie stosować na obszarach specjalnej ochrony ptaków (NATURA 2000).

Nie stosować na terenach odpoczynku ptaków wędrownych podczas migracji.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnym opakowaniu. Po otwarciu opakowania należy spodziewać się zmniejszonej skuteczności działania.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,

- w suchym i chłodnym miejscu,
- w temperaturze 0 °C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -