

B.RPC.622.1.2024

Informacja
o sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej
na obszarze administrowanym przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
stan na dzień 29.01.2024 r. na godz. 6.00 UTC

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne związane ze wzrostem stanów wód.

Województwo	Opis sytuacji	Stopień	Okres obowiązywania	Zlewnia
Warmińsko-mazurskie	W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, w zlewni dolnej Łyny przewiduje się dalszy wzrost poziomu wody, przy przekroczonym stanie alarmowym na Gubrze w Prośnie.	III	od 14:00 28.01.2024 r. do 12:00 29.01.2024 r.	Dolnej Łyny
Mazowieckie	W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, w zlewni dolnej Narwi przewiduje się wahania i wzrosty stanu wody, przy aktualnie przekroczonych stanach ostrzegawczych, z możliwością przekroczeń tych stanów w kolejnych profilach.	II	od 10:00 28.01.2024 r. do 10:00 29.01.2024 r.	Dolnej Narwi
Podlaskie	W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, w zlewni górnej Narwi prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody, z możliwością przekroczenia stanu alarmowego w Płoskach.	II	od 12:32 28.01.2024 r. do 12:00 29.01.2024 r.	Górnej Narwi
Podlaskie	W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych w zlewni Supraśli przewiduje się dalsze wzrosty i wahania stanu wody, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Sochoniach na Supraśli, z możliwością przekroczeń tych stanów w kolejnych profilach.	II	od 8:00 28.01.2024 r. do 10:00 29.01.2024 r.	Supraśli
Podlaskie	W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, w zlewni Biebrzy prognozowane są wahania poziomu wody przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Harasimowiczach na Sidrze oraz możliwością przekroczenia stanu alarmowego na Ledze w Rajgrodzie.	II	od 10:00 28.01.2024 r. do 10:00 29.01.2024 r.	Biebrzy

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne. (dot. zjawisk mogących wpływać na wzrosty stanu wód w rzekach).

3. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano przekroczenie stanu alarmowego na 1 stacji wodowskazowej oraz przekroczenie stanów ostrzegawczych na 8 stacjach wodowskazowych

Rzeka/Jezioro	Wodowskaz	Stan wody (cm)	Stan alarm. (cm)	Powyżej st. Alarm.(cm)	Stan ostrz. (cm)	Powyżej st. Ostrz.(cm)	Zmiana w ciągu 24 h (Δ cm)
Guber	Prosna	385	330	55	300	-	+3
Narew	Płoski	369	370	-	330	39	+10
Lega	Rajgród	158	160	-	140	18	+1
Czarna	Sochonie	106	120	-	100	6	-3
Ruż	Zaruzie	221	260	-	220	1	-4
Orz	Czarnowo	276	320	-	270	6	-13
Omulew	Białobrzeg Bliższy	185	220	-	180	5	+6
Supraśl	Nowosiółki	201	240	-	200	1	+3
Sokolda	Sokolda	251	300	-	250	1	+3

4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

Brak

5. Informacja o zagrożeniach

Ze względu na trwające roztopy i spływ wód opadowych oraz wydane ostrzeżenia hydrologiczne zachodzi ryzyko wystąpienia dalszych wahań i wzrostów stanu wody.

6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Monitorowanie sytuacji w ciekach i obiektach oraz prowadzenie wizji przez jednostki terenowe w związku z wydanymi ostrzeżeniami o roztopach.

7. Aktualna sytuacja hydrologiczna

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano niewielkie opady atmosferyczne.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano lokalnie wahania stanu wody i wzrosty związane z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych, lokalnie utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano:

Stacja wodowskazowa	Rzeka	Zmiana w ciągu doby (cm)
Różan	Narew	+ 10
Czarnowo	Orz	- 13

Ploski	Narew	+ 10
Suraż	Narew	+ 12
Gródek	Supraśl	+ 15
Supraśl	Supraśl	+ 12
Kulesze Chobotki	Nereśl	- 40

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, lokalnie i średniej i niskiej. Stan ostrzegawczy występuje na rz. Narew SW Ploski, rz. Lega SW Rajgród, rz. Czarna SW Sochonie, rz. Ruż SW Zaruzie, rz. Orz SW Czarnowo, rz. Omulew SW Białobrzeg Bliższy, rz. Supraśl SW Nowosiółki i rz. Sokołda w Sokołdzie.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano nieznaczne wahania wody związane ze spływem wód roztopowych, oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na SW Gołdap 2 rz. Gołdapa +10 cm, Sępole rz. Łyna – 14 oraz Jurkiszki rz. Gołdapa – 27 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej. Na wodowskazie Proсна rzeka Guber występuje stan alarmowy.

W **zlewni Niemna** obserwowano stabilizację i wahania wody związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie wodnym Narwi, Łyny i Węgorapy oraz Niemna jest na bieżąco monitorowana.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej .

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się wahania ze wzrostami związane z dalszym spływem wód roztopowych, lokalnie utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej i lokalnie średniej i niskiej. Występujące stany ostrzegawcze na rz. Narew SW Ploski, rz. Lega SW Rajgród, rz. Czarna SW Sochonie, rz. Ruż SW Zaruzie, rz. Orz SW Czarnowo, rz. Omulew SW Białobrzeg Bliższy, rz. Supraśl SW Nowosiółki oraz Sokołda i będą się utrzymywać.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się lokalnie stabilizację i wahania związane ze spływem wód roztopowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej. Stan alarmowy na rzece Guber w Prośnie będzie się utrzymywać.

W ciągu okresu prognostycznego w **zlewni Niemna** przewiduje się stabilizację i wahania stanu wody związane ze spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej.

Zjawiska lodowe rzeka Narew:

- od km 83+500 do 167+000 km brak zjawisk;
- od km 167+000 do 180+000 km 20% lód brzegowy,
- od 180+000 do 200+000 40% pokrywa lodowa;
- od 200+000 do 234+000 70% lód brzegowy;
- 234+000 do 248+500 km pokrywa lodowa 50%;

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje:

W dzień zachmurzenie duże i umiarkowane z postępującymi rozpogodzeniami. Początkowo miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowo-zachodni i południowy. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami mgły ograniczające widzialność od 300 do 500 m. Temperatura minimalna od --3°C do 0°C. Lokalnie przy gruncie spadki temperatury do -5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

8. Informacja o zbiornikach

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 32,27 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 225,66 %.

9. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych:

- Wydano *Komunikat Nawigacyjny nr 24/2023r.* informujący o zakończeniu redukcji oznakowania nawigacyjnego na sezon zimowy oraz zamknięciu dróg wodnych z dniem 29 listopada br. w związku z pojawieniem się zjawisk lodowych.

Komunikaty Nawigacyjne wydawane przez RZGW Białystok dostępne są pod adresem:

<https://bialystok.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>.

10. Inne informacje

Obszar ZZ Białystok:

Rzeki regionu utrzymują się w strefach stanów wysokich i lokalnie średnich. Tendencja poziomów wód rosnąca, lokalnie stabilizacja. Na stacji wodowskazowej w Sochoniach rz. Czarna i Nowosiółki rz. Supraśl przekroczone stany ostrzegawcze.

NW Łapy: Występują lokalne rozlewiska wzdłuż rzek Liza, Awissa, Ślina (dopływy Narwi) na obszarach użytków rolnych. Nie występuje zagrożenie dla mienia i ludzi.

NW Bielsk Podlaski: stan około alarmowy na rzece Narew m. Ploski.

Na terenach zakwalifikowanych jako zalewowe (nieużytki) rzeki Narew w m. Ploski występują rozlewiska na obszarze około 25 ha (tereny z obu stron mostu w kierunku wsi Kaniuki i Wojszki).

Obszar ZZ Ostrołęka:

Rzeki regionu utrzymują się w strefach stanów wysokich rzeki Rozoga i Szkwa. Stany ostrzegawcze występują na rzekach: Orz, Ruż, i Omulew z tendencją stabilizacji.

NW Szczytno:

Na terenach zakwalifikowanych jako zalewowe (użytki rolne) rzeki Omulew występują rozlewiska pokryte lodem ok. 40ha w msc. Surowe, gm. Czarnia. Nie występuje zagrożenie dla tras komunikacyjnych i zabudowań mieszkalnych.

NW Ostrołęka:

Występują lokalne rozlewiska na nieużytkach (łąki):

- rzeki Rozoga: gm. Lelis, m. Łęg Starościński na obszarze około 14 ha; gm. Sypniewo, m. Zalesie Wielkie około 8 ha; gm. Kadzidło m. Todzia około 4 ha,
- rzeka Orz, gm. Goworowo m. Goworowo, powierzchnia zalana to około 20 ha;
- rzeka Piasecznica, gm. Kadzidło, m. Kadzidło, powierzchnia zalana to około 5 ha i gm. Lelis m. Łodziska około 12 ha;

Obszar ZZ Olsztyn:

Rzeki regionu utrzymują się w strefach stanów wysokich, jeziora na poziomach stanów średnich. Tendencja poziomów wód rosnącą, lokalnie stabilizacja. Występuje naturalny przepływ wód.

Stan alarmowy w miejscowości Proсна – rzeka Guber – 384 cm (wzrost w ciągu doby o 3 cm)

Nadzór Wodny Kętrzyn: Występują lokalne rozlewiska na obszarach użytków rolnych, w obrębie dopływów rzeki Guber: rzeka Liwna obr. Barciany pow. kętrzyński, rzeka Zolka obr. Silginy gm. Barciany, pow. kętrzyński.

Nw Mrągowo:

Występują podtopienia i zalania gruntów przyległych do rzeki Sajna (lewobrzeżny dopływ rz. Guber) w msc. Bykowo i Sątoczno, przy drodze Korsze - Sątoczno i Sątoczno – Krelikiejmy, gm. Korsze. Zalanych zostało ok. 50 ha. Na rzece Sajna przy Polderze Sątopy – Samulewo wysoki stan wody.

NW Bartoszyce: Występują lokalne rozlewiska na obszarach użytków zielonych około 15 ha w m. Rygarby gm. Sępól (dopływ Łyny rz. Pisa) oraz miejscowości Lwowiec gmina Sępól (dopływ Gubra rz. Mamłak) na obszarze około 20 ha.

Obszar ZZ Giżycko:

Nw Gołdap

Stany wód na rz. Gołdapie kształtują się na poziomie stanów wysokich. Sytuacja stabilizuje się. Prognozowany trend spadkowy. Występują podtopienia gruntów rolnych na obrzeżach m. Banie Mazurskie i terenie zielonym w miejscowości.

Na rz. Jarka - stany wód kształtują się w strefie stanów wysokich. Woda w kilku miejscach występuje z koryta i podtapia obszary jedynie wzdłuż cieku (użytki zielone)

Trend rosnący utrzymuje się natomiast na rz. Węgorapa w msc. Mieduniszki. Rzeka mieści się w korycie.

Obszar ZZ Augustów:

Rzeki regionu utrzymują się w strefach stanów wysokich i średnich. Sytuacja na rzece Sidra gdzie występował stan alarmowy obecnie poziom wód kształtuje się poniżej stanu ostrzegawczego.

NW Olecko:

Stany wód kształtują się na poziomie wysokim – rz. Lega w okolicy Rajgrodu (pomiędzy Jez. Rajgrodzkim a jez. Dreństwo). Mimo stanów ostrzegawczych rzeka Lega mieści się w korycie, nie zagraża bezpieczeństwu

mienia i życia.

Występujące rozlewiska na obszarach nieużytków i użytków rolnych nie stwarzają zagrożenia dla zabudowań gospodarskich, mieszkalnych, tras komunikacyjnych i ludzi.

Jednostki terenowy prowadzą wzmożony monitoring cieków i prowadzą współpracę i wymianę informacji z jednostkami samorządu terytorialnego.

Do Centrum Operacyjnego i jednostek terenowych nie wpłynęła informacja o wystąpieniu zagrożenia dla mienia i ludzi.

Komunikat o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej został opracowany przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie danych własnych oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB.

Opracowanie raportu: :Beata Dąbrowska