

Posiadacz zezwolenia :

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, Parc d'Affaires de Crécy, 10A Rue de la Voie Lactée, F - 69370 Saint Didier au Mont-d'Or, Republika Francuska

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

AGRA-H, Krzysztof Wojdyła i Henryk Krzysztof, Import - Export Sp. Jawna

ul. Nyska 27, 48-351 Biała Nyska, e-mail: agra-h@agra-h.pl; tel/fax: (77) 435 68 25

AGROSIMEX Sp. z o.o., ul. Goliany 43, 05-620 Błędów, tel.: (48) 668 07 90, fax: (48) 668 04 86, e-mail: agrosimex@agrosimex.com.pl

„AGRO-BIZNES” Sp. Jawna, Sularz-Rudnicki, ul. Myśliborska 56, 66-400 Gorzów

Wielkopolski, tel: (95) 720 62 75; tel/fax: (95) 731 42 24;

e-mail: sekretariat@agro-biznes.pl

Agrokon Sp z.o.o., Zakładowa 7, 62-510 Konin; tel./fax: (63) 248 87 66 e-mail: agrokon@interia.pl

Agro-Bakałarzewo Sp. z o.o. ul. Polna 3, 16-423 Bakałarzewo, tel (87) 569 43 06, fax: (87) 569 40 52, e-mail: agrobak@suwalki.com.pl

CIECH S.A. ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, tel.: (22) 639 15 84, fax: (22) 638 15 98, e-mail: elzbieta.browarek@ciech.com

JAWAL & M. R. Z. Murawiec Sp. Jawna, ul. Polna 17, 89-115 Mrocza, Tel./fax: (52) 385 63 36, e-mail: jawalm@wp.pl

Osadkowski S.A., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, tel.: (71) 314 64 54, fax: (71) 314 64 65, e-mail: centrum@osadkowski.com.pl

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "CHEMIROL" Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, tel. (52) 318 88 88, fax: (52) 318 88 46, e-mail: piotrk@chemirol.com.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

„SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i Wsp. Sp. Jawna, 62-002 Suchy Las, ul.

Jagodowa 4, tel. 61 812 51 13, fax 61 297 26 02, e-mail: sumin@sumin.com.pl

„TARGET” S.A., Kartoszyño, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel. 58 774 10 90, fax 58 676 74 89, e-mail: info@target.com.pl

ADMIRAL 100 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

piryproksyfen (związek z grupy pochodnych eterowych pirydyny) - 100 g/l (10,87 %)

Substancja niebezpieczna nie będąca substancją czynną: ksylen – mieszanina izomerów.

Zezwolenie MRiRW nr R - 201/2019 z dnia 29.11.2019 r.

	
Niebezpieczeństwo	
H304	Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 066	Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
EUH 401	W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P280	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
P301 + P310	W PRZYPADKU POŁKNIECIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P331	NIE wywoływać wymiotów.
P391	Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

INSEKTYCYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczonym do zwalczania różnych stadiów rozwojowych mączlików. Środek zakłóca równowagę hormonalną u owadów powodując zaburzenie procesów rozwojowych i obniżając płodność. Efekt działania środka jest widoczny później niż ma to miejsce w przypadku insektycydów o działaniu neurotoksycznym. Na roślinie działa powierzchniowo.

Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna piryproksyfen należy do grupy 7C.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza samobieżnego lub opryskiwacza ręcznego (w tym plecakowego).

Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.

Pomidor, papryka, ogórek, oierzyna (pod osłonami)

mączliki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075% (75 ml środka w 100 litrach wody)

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania (zalecane stężenie): 0,05-0,075% (50-75 ml środka w 100 litrach wody)

Termin stosowania środka: środek stosować do fazy w której 80 % owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 88)

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-1500 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Rośliny ozdobne (pod osłonami)

mączliki (średni poziom zwalczania)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075% (75 ml środka w 100 litrach wody)

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania (zalecane stężenie): 0,05-0,075% (50-75 ml środka w 100 litrach wody)

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

pomidor, oierzyna, papryka, ogórek (pod osłonami) - 3 dni

rośliny ozdobne - nie dotyczy

Zaleca się:

- zabieg wykonać na samym początku zasiedlania uprawy przez szkodnika,
- wyższe stężenia środka stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika,
- w celu zwiększenia skuteczności środka dobrze pokryć cieczą użytkową dolną stronę liści, miejsca składania jaj i żerowania szkodnika,
- przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna piriproksyfen należy do grupy analogów hormonów juvenilnych (IRAC 7C). Działanie polega na zaburzeniu procesów morfogenetycznych, obniżeniu płodności oraz ograniczeniu embriogenezy. W celu przeciwdziałania powstawania odporności środek stosować przemiennie ze środkami z innych grup chemicznych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wleciu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

- jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
24 godziny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony owadów zapylających nie stosować środka gdy na roślinach uprawnych występuje spadź.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody

W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc/lekarzem.

Nie wywoływać wymiotów.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -