



Znak sprawy: DHR.rs2.8202.79.2025

DECYZJA nr R-11/2026d

Na podstawie art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009¹ (dalej jako: rozporządzenie nr 1107/2009) oraz w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy o środkach ochrony roślin² (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin) po rozpatrzeniu wniosku z 3 września 2025 r. spółki W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, D-31860 Emmerthal, Republika Federalna Niemiec

zmieniam

zezwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-45/2024 z dnia 21 marca 2024 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin **Neudosan** w następujący sposób:

1) Poniżej wskazane załączniki do przedmiotowego zezwolenia:

- Załącznik nr 2 - **OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN**
 - Załącznik nr 9 - **ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN**
- otrzymują brzmienie określone w niniejszej decyzji.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/WE i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

² Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2024 r. poz. 630 t.j.).

Załącznik nr 2 - OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

OPIS DZIAŁANIA

INSEKTYCYD o działaniu kontaktowym, w postaci koncentratu rozpuszczalnego (SL) w wodzie. Przeznaczony do zwalczania postaci dorosłych i larwalnych oraz jaj owadów i roztoczy. Na roślinie działa powierzchniowo.

Substancja czynna środka wykazuje fizyczny sposób działania na szkodniki i powoduje m.in. uszkodzenia kutikuli, a po wnikięciu do ciała szkodnika zaburzenia w osmoregulacji i w funkcjonowaniu układu oddechowego i nerwowego.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz polowych lub opryskiwaczy ręcznych.

Jabłoń

Mszyce (z wyłączeniem bawełnicy korówki), przędziorki.

Maksymalne /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 l/ha (17,5 l na 10 000 m² opryskiwanej powierzchni ściany liści - LWA).

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Zalecana ilość wody: 1500 l/ha.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Grusza

Miodówki

Maksymalne/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 l/ha (17,5 l na 10 000 m² opryskiwanej powierzchni ściany liści - LWA).

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Zalecana ilość wody: 1500 l/ha.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka z dalszej części etykiety: 5.

Wiśnia

Mszyca wiśniowa i inne gatunki mszyc

Maksymalne/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 l/ha.

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Zalecana ilość wody: 1500 l/ha.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Śliwa

Mszyca śliwowo-trzcinowa i inne gatunki mszyc

Maksymalne /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 l /ha.

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Zalecana ilość wody: 1500 l/ha.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Ogórek, dynia zwyczajna, cukinia, melon, pomidor, papryka, olerżyna uprawiane w szklarni

Mszyce, przędziorki, mączlik szklarniowy

Zalecana dawka środka dla upraw warzyw prowadzonych pionowo: 18,0 l na 10 000 m² opryskiwanej powierzchni ściany liści – LWA.

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody

Wysokość roślin powyżej 125 cm: 36 l/ha środka w 1800 l wody.

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tej uprawie).

Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pak choi, jarmuż, kapusta brukselska, brokuł zwyczajny, rzepa, kapusta pekińska uprawiane w polu

Mszyce

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym kapusty włoskiej, kapusy pak choi, jarmuża, kapusty brukselskiej, brokuła zwyczajnego, rzepy: 5.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym kapusty głowiastej białej, kapusty głowiastej czerwonej, kapusty pekińskiej uwzględniająca zastosowanie środka z dalszej części etykiety: 5.

Kalafior, kapusta pak choi, jarmuż, kapusta brukselska, brokuł zwyczajny, rzepa, kapusta pekińska uprawiane w szklarni

Mączlik szklarniowy

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody.

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5.

Fasola zwykła uprawiana na suche nasiona, fasola wielokwiatowa uprawiana na suche nasiona uprawiane w polu

Mszyca burakowa

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody

Wysokość roślin powyżej 125 cm: 36 l/ha środka w 1800 l wody

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka z dalszej części etykiety: 5.

Róża, chryzantema, bluszcz i inne rośliny ozdobne uprawiane w szklarni

Mszyce, przędziorki, mączlik szklarniowy

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody,

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody,

Wysokość roślin powyżej 125 cm: 36 l/ha środka w 1800 l wody.

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5.

**STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH**

*Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.*

Morela, czereśnia, brzoskwinia

Mszyce, miodówki, przędziorki

Maksymalne/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 l /ha.

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Zalecana ilość wody: 1500 l/ha.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Grusza

Mszyce, przędziorki

Maksymalne/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 l /ha (17,5 l na 10 000 m² opryskiwanej powierzchni ściany liści - LWA).

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Zalecana ilość wody: 1500 l/ha.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka z wcześniejszej części etykiety: 5.

Jeżyna, malina, borówka czarna, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, jarząb, borówka amerykańska, bez czarny, borówka brusznica, żurawina

Mszyce

Maksymalne/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 l /ha.

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Malina uprawiana w polu, w szklarniach i w wysokich tunelach foliowych.

Wciornastki, przędziorki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 l /ha.

Maksymalna/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Zalecana ilość wody: 700-1000 l/ha.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Sałata, cykoria, endywia, roszponka warzywna, szpinak, burak liściowy (boćwina), portulaka warzywna, rukola uprawiane w polu

Mszyce

Zalecana dawka środka i ilość wody: 18 l/ha środka w 900 l wody.

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Sałata, cykoria, endywia, roszponka warzywna, szpinak, burak liściowy (boćwina), portulaka warzywna, rukola uprawiane w szklarni

Mszyce, mączliki

Zalecana dawka środka i ilość wody: 18 l/ha środka w 900 l wody.

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5.

Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kalafior uprawiane w polu

Mączliki, wciornastki

Zalecana dawka środka i ilość wody: 18 l/ha środka w 900 l wody.

Maksymalna/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym kalafiora: 5.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym kapusty głowiastej białej, kapusty głowiastej czerwonej, kapusty pekińskiej uwzględniająca zastosowanie z wcześniejszej części etykiety: 5.

Rośliny zielarskie uprawiane w szklarni

Mszyce, przędziorki, mączliki

Zalecana dawka środka i ilość wody: 18 l/ha środka w 900 l wody.

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Zalecana ilość wody: 900 l/ha.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5.

Dynia makaronowa, dynia olbrzymia, dynia piżmowa, dynia zwyczajna, dynia zwyczajna typ użytkowy cukinia, dynia zwyczajna typ użytkowy kabaczek, dynia zwyczajna typ użytkowy patison uprawiane w polu

Mszyce

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody.

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody.

Wysokość roślin powyżej 125 cm: 36 l/ha środka w 1800 l wody.

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tej uprawie).

Melon, ogórek, pomidor, papryka, bakłażan uprawiane w polu

Mszyce

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody.

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody.

Wysokość roślin powyżej 125 cm: 36 l/ha środka w 1800 l wody.

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym melona, papryki, bakłażana: 5.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym ogórka i pomidora uwzględniająca zastosowanie z dalszej części etykiety: 5.

Ogórek, pomidor uprawiane w polu

Mączliki, wciornastki, przędziorki

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody.

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody.

Maksymalna/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym ogórka i pomidora uwzględniająca zastosowanie z wcześniejszej części etykiety: 5.

Cebula, cebula siedmiolatka

Mszyce, wciornastki

Zalecana dawka środka i ilość wody: 18 l/ha środka w 900 l wody.

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 900 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Por uprawiany w polu

Wciornastki, przędziorki

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody.

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody.

Maksymalna/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Marchew, rzodkiewka (w uprawie polowej i w uprawie szklarniowej)

Mszyce

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody.

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody.

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5.

Seler, brukiew, pasternak, rzodkiew, burak ćwikłowy, topinambur, salsefia uprawiane w polu

Mszyce

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody.

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody.

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Fasola wielokwiatowa uprawiana na suche nasiona, fasola zwykła uprawiana na suche nasiona uprawiane w polu

Mszyce (poza mszycą burakową)

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody.

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody.

Wysokość roślin powyżej 125 cm: 36 l/ha środka w 1800 l wody.

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie z wcześniejszej części etykiety: 5.

Groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy uprawiane w polu

Mszyca burakowa

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody.

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody.

Wysokość roślin powyżej 125 cm: 36 l/ha środka w 1800 l wody.

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Rośliny warzywne uprawiane na młode uprawiane w polu i w szklarni

Mszyce

Zalecana dawka środka i ilość wody: 18 l/ha środka w 900 l wody.

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawienia się szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5.

Uzasadnienie

Wnioskiem z 3 września 2025 r. spółka W. Neudorff GmbH KG, Republika Federalna Niemiec wystąpiła w trybie art. 51 rozporządzenia 1107/2009 o rozszerzenie zakresu stosowania środka ochrony roślin Neudosan obejmujące zwalczania wciornastków, przędziorków w uprawianej w polu, w wysokich tunelach foliowych i szklarni malinie, mączlików i wciornastków w uprawianej w polu kapuście głowiastej białej, kapuście głowiastej czerwonej, kapuście pekińskiej i kalafiorze, mączlików i wciornastków w uprawianych w polu ogórku i pomidorze, wciornastków w uprawianej w polu cebuli i cebuli siedmiolatce, wciornastków i przędziorków w uprawianym w polu porze.

Środek ochrony roślin Neudosan we wnioskowanym zakresie stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia człowieka i zwierząt wynikającego z jego stosowania i pozostałości oraz nie wykazuje negatywnego oddziaływania na środowisko oraz na gatunki niebędące celem jego działania. Dla proponowanego zakresu stosowania środka ochrony roślin Neudosan analiza ryzyka w zakresie wpływu na zdrowie człowieka i zwierząt wynikającego ze stosowania i pozostałości środka ochrony roślin, a także wpływu na los i zachowanie środka w środowisku oraz oddziaływania na gatunki niebędące celem działania przedmiotowego środka ochrony roślin została oparta na ocenie ryzyka zawartej w raportach rejestracyjnych wykonanych na potrzeby wydania zezwolenia na dopuszczanie do obrotu w Republice Federalnej Niemiec zezwoleniem nr ZV1 034207-00/00 z dnia 13 listopada 2019 r. środka ochrony roślin pod nazwą handlową Neudosan Neu Blattlausfrei.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że środek ochrony roślin Neudosan spełnia wymagania określone w art. 29 i w art. 51 ust. 2 pkt b) rozporządzenia nr 1107/2009.

Środek ochrony roślin Neudosan może być stosowany w rozszerzonym na uprawy małoobszarowe zakresie przez wszystkich zainteresowanych jego stosowaniem użytkowników profesjonalnych, a odpowiedzialność za ewentualny brak skuteczności działania środka ochrony roślin i jego fitotoksyczność zgodnie z art. 51 ust. 5 rozporządzenia nr 1107/2009 ponosi osoba stosująca środek ochrony roślin.

Pismem z dnia 28 grudnia 2025 r. w formie korespondencji e-mail, doręczonym pełnomocnikowi spółki W. Neudorff GmbH KG, Republika Federalna Niemiec w tym samym dniu, strona została powiadomiona o zakończeniu postępowania wyjaśniającego. W treści zawiadomienia organ pouczył

stronę, iż na zasadzie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.³ (dalej jako: k.p.a.), został wyznaczony siedmiodniowy termin, liczony od dnia otrzymania pisma, na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów. W dniu 7 stycznia 2026 r. pełnomocnik spółki odpowiedział na zawiadomienie i nie wniósł żadnych uwag.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Opłaty

Czynności związane z wydaniem przedmiotowego zezwolenia podlegają opłacie na podstawie art. 15 ust.1 ustawy o środkach ochrony roślin. W związku z powyższym, wydanie stosownej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej⁴.

Pouczenie

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a..

Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 zł.

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, zgodnie z art. 239 § 1 *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi*⁵ albo przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243 § 1 tej ustawy. Strona może również, stosownie do treści art. 127a k.p.a. zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

³ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.)

⁴ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154 t.j.).

⁵ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.)

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Flaszka
dyrektor
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje: *(za zwrotnym dowodem doręczenia)*

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(zezwolenia.sor@piorin.gov.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB
(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa
(ochrona.roslin@inhort.pl)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych