



Minister  
Zdrowia

---

PLD.4731.2.2026.AK  
Warszawa, 01 czerwca 2026

**KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA**  
**w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury**  
**ratunkowego dostępu do technologii lekowych**

Na podstawie art. 47f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, z późn. zm.)<sup>1</sup> w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 499), Minister Zdrowia ogłasza listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Jednocześnie Minister Zdrowia informuje, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych przed dniem obowiązywania właściwego wykazu, mają prawo do kontynuacji leczenia pod warunkiem udowodnienia skuteczności dotychczasowego leczenia. Informacja o kontynuacji leczenia powinna zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Niniejszy Komunikat wchodzi w życie w terminie 7 dni od daty jego publikacji.

Z wyrazami szacunku  
z upoważnienia Ministra Zdrowia  
Katarzyna Kacperczyk  
Podsekretarz Stanu  
/dokument podpisany elektronicznie/

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 858, 1222, 1593, 1615 i 1915 oraz z 2025 r. poz. 129, 304, 620, 637, 779, 1192, oraz 1211



Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa międzynarodowa	Postać	Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany	Kod ICD-10	Uwagi
1.	Abecma	<i>Idecabtagene vicleucel</i>	dyspersja do infuzji	Szpiczak plazmocytowy	C90.0	leczenie opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytoowego u dorosłych pacjentów - terapia po uprzednim zastosowaniu co najmniej dwóch linii leczenia, w tym zawierających lek immunomodulujący, inhibitor proteasomu oraz przeciwciało anti-CD38
2.	Adynovi	<i>Rurioctocogum alfa pegolum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B	D66, D67	w populacji pacjentów <12 roku życia
3.	Afinitor	<i>Everolimus</i>	tabletki	Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu	C50	brak
4.	Agamree	<i>Vamorolonum</i>	zawiesina doustna	Dystrofia mięśniowa Duchenne'a	G71.0	w populacji pacjentów <b>niespełniających</b> kryteriów wyszczególnionych w rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 30/2026, tj. zdolność do samodzielnego chodzenia, wynik testu czasu wstawania z leżenia (TTSTAND) <10 s

5.	Aimovig	<i>Erenumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Migrena przewlekła	G43	brak
6.	Ajovy	<i>Fremanezumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Migrena epizodyczna	G43	rekomendacja dotyczyła objęcia refundacją w migrenie przewlekłej i epizodycznej; <b>lek objęty refundacją w migrenie przewlekłej</b>
7.	Ayvakyt	<i>Avapritinib</i>	tabletki powlekane	Indolentna mastocytoza układowa	D47.0	leczenie dorosłych chorych na indolentną mastocytozę układową z objawami umiarkowanymi lub ciężkimi, niedostatecznie kontrolowanymi leczeniem objawowym
8.	Bavencio	<i>Avelumab</i>	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	Leczenie raka nerki	C64	wiek 18 lat i powyżej; histologicznie potwierdzone rozpoznanie raka nerkowokomórkowego z komponentem jasnokomórkowym; w terapii skojarzonej z aksytynibem; nowotwór w stadium zaawansowanym (obecne przerzuty odległe) lub nawrót po leczeniu chirurgicznym lub brak możliwości radykalnego leczenia chirurgicznego; brak wcześniejszego leczenia farmakologicznego raka nerki;

9.	Berinert 2000	<i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy (HAE)	D84.1	leczenie zapobiegawcze pacjentów z nawracającymi napadami HAE o ciężkim przebiegu <b>w wyłączeniem kobiet w ciąży, u których stwierdza się niedobór inhibitora C1-esterazy</b>
10.	Berinert 3000	<i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy	D84.1	leczenie zapobiegawcze pacjentów z nawracającymi napadami HAE o ciężkim przebiegu <b>w wyłączeniem kobiet w ciąży, u których stwierdza się niedobór inhibitora C1-esterazy</b>
11.	Brineura	<i>Cerliponase alfa</i>	roztwór do infuzji + roztwór do przepłukiwania	Leczenie lipofuscynozy neuronalnej typu 2	E75.4	brak
12.	Brukina	<i>Zanubrutinib</i>	kapsułki twarde	Przewlekła białaczka limfocytowa / chłoniak z małych limfocytów B	C91.1	monoterapia dorosłych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową, w tym z chłoniakiem z małych limfocytów B- subpopulacja FIT (tj. bez przeciwwskazań do rozpoczęcia I linii z wykorzystaniem schematu FCR)
13.	Calquence	<i>Acalabrutinib</i>	tabletki powlekane	Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe	C82, C83, C85	leczenie chłoniaka z komórek płaszczą - I linia leczenia dorosłych chorych, niekwalifikujących się do autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych (autoHSCT) - terapia skojarzona z bendamustyną oraz rituksymabem

14.	Calquence	<i>Acalabrutinib</i>	tabletki powlekane	Przewlekła białaczka limfocytowa	C91.1	I linia leczenia u dorosłych chorych, niezależnie od statusu delecji 17p / mutacji TP53 - terapia skojarzona z wenetoklaksem i obinutuzumabem lub z wenetoklaksem
15.	Cresemba	<i>Isavuconazolum</i>	kapsułki twarde	Inwazyjna aspergilloza; mukormykoza	B44, B46	inwazyjna aspergilloza - w populacji pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie worykonazolem; mukormykoza - u pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie amfoterycyną B
16.	Cresemba	<i>Isavuconazolum</i>	proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji	Inwazyjna aspergilloza; mukormykoza	B44, B46	inwazyjna aspergilloza - w populacji pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie worykonazolem; mukormykoza - u pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie amfoterycyną B
17.	Darzalex	<i>Daratumumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Szpiczak plazmocytowy	C90.0	leczenie dorosłych chorych na uprzednio nieleczonego szpiczaka plazmocytoowego, niekwalifikujących się do autologicznego przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych (autoHSCT)
18.	Ebglyss	<i>Lebrikizumab</i>	roztwór do	Atopowe zapalenie	L20	leczenie pacjentów w wieku 12

			wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	skóry		lat i powyżej z umiarkowaną postacią atopowego zapalenia skóry
19.	Ebglyss	<i>Lebrikizumab</i>	roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce			
20.	Emgality	<i>Galcanezumab</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	Migrena przewlekła	G43	W ramach leczenia profilaktycznego
21.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka	Leczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów	M05, M06, M08	brak
22.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	Leczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów	M05, M06, M08	brak
23.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka	Leczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów	L40.5, M07.1, M07.2, M07.3	brak
24.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	Leczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów	L40.5, M07.1, M07.2, M07.3	brak
25.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań,	Leczenie aktywnej postaci	M45	brak

			ampułkostrzykawka	zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)		
26.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	Leczenie aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)	M45	brak
27.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka	Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK	M46.8	brak
28.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK	M46.8	brak
29.	Erlotinib Krka	<i>Erlotinibi hydrochloridum</i>	tabletki powlekane	Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca	C34	
30.	Erlotinib Mylan	<i>Erlotinib</i>	tabletki powlekane	Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca	C34	brak
31.	Erlotinib Vipharm	<i>Erlotinib</i>	tabletki powlekane	Leczenie niedrobnokomórkowego lub	C34	brak

				drobnokomórkowego raka płuca		
32.	Esperoct	<i>Turoctocog alfa pegol</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Leczenie i profilaktyka krwawień u chorych na hemofilię A (wrodzony niedobór czynnika VIII)	D66	w populacji pacjentów w wieku 12 lat i powyżej
33.	Fibryga	<i>Fibrinogenum humanum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji	Nabyta hipofibrynogenemia	D68.4	optymalizacja leczenia farmakologicznego ciężkiego krwotoku okołozabiegowego u pacjentów z nabytą hipofibrynogenemią
34.	Filsuvez	<i>Birch bark extract</i>	żel	Pęcherzowe oddzielanie się naskórka	Q81	leczenie ran o częściowej grubości związanych z postacią dystroficzną pęcherzowego oddzielania się naskórka (DEB) i postacią graniczną pęcherzowego oddzielania się naskórka (JEB) u pacjentów w wieku 6 miesięcy i starszych
35.	Fotivda	<i>Tivozanib hydrochloride monohydrate</i>	kapsułki twarde	Leczenie raka nerki	C64	brak
36.	Hemlibra	<i>Emicizumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Zapobieganie krwawieniom u dorosłych z ciężką hemofilią A niepowikłaną inhibitorem	D66	Leczenie chorych >18 r. ż., ze zdiagnozowaną ciężką hemofilią A bez inhibitora, spełniających kryteria: 1) wystąpienia co najmniej sześciu krwawień rocznie 2) jednego samostnego krwawienia zagrażającego życiu pacjenta, jeżeli u pacjenta stwierdza się: a) brak możliwości prowadzenia

						<p>długoterminowej profilaktyki koncentratem czynnika VIII z powodu trudnego lub niemożliwego dostępu żylnego, lub</p> <p>b) brak możliwości prowadzenia długoterminowej profilaktyki koncentratem czynnika VIII z powodu udokumentowanych chorób towarzyszących, które w ocenie Zespołu Koordynacyjnego uniemożliwiają przestrzeganie zalecanego schematu</p> <p>c) brak skuteczności regularnie prowadzonej profilaktyki maksymalnymi dawkami koncentratu czynnika VIII definiowane jako występowanie krwawień przebijających lub</p> <p>d) brak tolerancji na koncentraty czynnika VIII, która w ocenie Zespołu Koordynacyjnego uniemożliwia dalsze ich stosowanie u pacjenta.</p>
37.	Humira	<i>Adalimumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Leczenie adalimumabem ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim	L73.2	brak

38.	Hypavzi	<i>Marstacimab</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	Hemofilia A, hemofilia B	D66, D67	rutynowa profilaktyka epizodów krwawień u chorych w wieku 12 lat i starszych, z ciężką hemofilią A bez inhibitorów czynnika VIII (FVIII) lub z ciężką hemofilią B bez inhibitorów czynnika IX (FIX)
39.	Ilaris	<i>Canakinumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych	E85, R50.9, D89.8, D89.9	w leczeniu wrodzonych zespołów autozapalnych: CAPS (w tym: NOMID/CINCA; MWS; FCAS); TRAPS; HIDS/MKD; FMF po nieskuteczności leczenia maksymalną tolerowaną dawką kolchicyny
40.	Imfinzi	<i>Durvalumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Rak wątrobowokomórkowy	C22.0	leczenie I linii dorosłych pacjentów z zaawansowanym lub nieoperacyjnym rakiem wątrobowokomórkowym (HCC) z zachowaną czynnością wątroby (skala Child-Pugh A) - <b>terapia skojarzona z tremelimumabem</b>
41.	Imfinzi	<i>Durvalumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny w leczeniu neoadjuwantowym, a następnie w monoterapii jako leczenie adjuwantowe u dorosłych chorych na operacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca z wysokim ryzykiem nawrotu oraz brakiem rearanżacji w genie EGFR lub rearanżacji genu ALK

42.	Imjudo	<i>Tremelimumabum</i>	proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	Rak wątrobowokomórkowy	C22.0	leczenie I linii dorosłych pacjentów z zaawansowanym lub nieoperacyjnym rakiem wątrobowokomórkowym (HCC) z zachowaną czynnością wątroby (skala Child-Pugh A) - <b>terapia skojarzona z durwalumabem</b>
43.	Jaypirca	<i>Pirtobrutinib</i>	tabletki powlekane	Chłoniak z komórek płaszczka	C85.7	monoterapia dorosłych pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszczka - nawrót, progresja lub oporność po minimum jednej linii leczenia, w tym terapii inhibitorem kinazy Brutona
44.	Jaypirca	<i>Pirtobrutinib</i>	tabletki powlekane	Przewlekła białaczka limfocytowa	C91.1	monoterapia u dorosłych pacjentów z oporną lub nawrotową przewlekłą białaczką limfocytową, bez względu na status delekcji 17p / mutacji w genie TP53 (del17p / mTP53), u których stosowano co najmniej jedną linię leczenia, w tym inhibitor kinazy Brutona niezależnie od linii leczenia
45.	Kanuma	<i>Sebelipazum alfa</i>	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	Leczenie chorych z niedoborem lizosomalnej kwaśnej lipazy	E75.5, E75.6	brak
46.	Ketokonazol HRA	<i>Ketoconazolum</i>	tabletki	Endogeny zespół		> 12 r. ż.

				Cushinga		
47.	Keytruda	<i>Pembrolizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Leczenie raka nerki	C64	I linia terapii, u pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym o rokowaniu pośrednim i niekorzystnym wg IMDC - terapia skojarzona z aksytynibem
48.	Keytruda	<i>Pembrolizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Rak urotelialny	C61, C65, C66, C67, C68	I linia leczenia raka urotelialnego w stadium miejscowego zaawansowania poza możliwościami miejscowego leczenia o charakterze radykalnym lub w stadium uogólnienia - terapia skojarzona z enfortumabem wedotyny
49.	Kinpeygo	<i>Budesonidum</i>	kapsułki twarde	Pierwotna nefropatia IgA	N02.8	w ramach rozszerzenia populacji docelowej do pacjentów dorosłych z pierwotną nefropatią IgA z poziomem białka w moczu $\geq 1,0\text{g/dobę}$ (lub stosunkiem stężenia białka do kreatyniny w moczu $\geq 0,8\text{ g/g}$ )
50.	Krazati	<i>Adagrasib</i>	tabletki powlekane	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	leczenie dorosłych pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacją G12C w genie KRAS i progresją choroby po co najmniej jednej wcześniejszej terapii systemowej (tj. immunoterapii lub immunochemioterapii lub chemioterapii z zastosowaniem pochodnych platyny)

51.	Kymriah	<i>Tisagenlecleucel</i>	dyspersja do infuzji, 1,2 x10 <sup>6</sup> - 6x 10 <sup>8</sup> komórek w worku infuzyjnym	Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe	C82, C83, C85	leczenie dorosłych chorych na chłoniaka grudkowego o stopniu złośliwości G1, G2 lub G3A, z udokumentowanym niepowodzeniem dwóch lub więcej linii leczenia systemowego, w tym zawierającego przeciwciało anty- CD20 i związki alkilujące
52.	Kyprolis	<i>Carfilzomibum</i>	proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Szpiczak plazmocytowy	C90.0	terapia skojarzona z daratumumabem i deksametazonem dorosłych chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytoowego po uprzednim zastosowaniu 1, 2 albo 3 linii leczenia
53.	Lamzede	<i>Velmanase alfa</i>	proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Leczenie łagodnej do umiarkowanej alfa- mannozydozy	E77.1	brak
54.	Lecigon	<i>Levodopum + Carbidopum + Entacaponium</i>	żel do podania dojelitowego	Choroba Parkinsona	G20	leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona
55.	Lenvima	<i>Lenvatinib</i>	kapsułki twarde	Leczenie zaawansowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodem radioaktywnym	C73	brak
56.	Lojuxta	<i>Lomitapidum</i>	kapsułki twarde	Hipercholesterolemia rodzinna	E78.01	postać homozygotyczna; populacja pacjentów dorosłych

57.	Lonquex	<i>Lipegfilgrastimum</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka	Skrócenie czasu trwania neutropenii z gorączką lub zmniejszenie częstości występowania neutropenii z gorączką		u pacjentów z nowotworami złośliwymi (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych poddawanych chemioterapii cytotoksycznej o odstępach czasu pomiędzy cyklami nie krótszych niż 14 dni
58.	Lynparza	<i>Olaparib</i>	tabletki powlekane	Rak gruczołu krokowego	C61	leczenie opornego na kastrację, przerzutowego raka gruczołu krokowego u dorosłych pacjentów, u których nie jest wskazana chemioterapia - terapia skojarzona z octanem abirateronu
59.	Lynparza	<i>Olaparib</i>	tabletki powlekane	Leczenie pacjentów z przerzutowym lub niekwalifikującym się do leczenia radykalnego gruczolakiem trzustki	C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.5, C25.7, C25.8, C25.9	u pacjentów z obecnością mutacji BRCA1/2
60.	Lyvdelzi	<i>Seladelpar</i>	kapsułki twarde	Pierwotne zapalenie dróg żółciowych	K74.3	w populacji dorosłych pacjentów z niewystarczającą odpowiedzią na leczenie z zastosowaniem kwasu ursodeoksycholowego lub z jego nietolerancją, u których stwierdza się nietolerancję lub przeciwwskazania do stosowania terapii fibratami

61.	MabThera	<i>Rituximab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Chłoniaki złośliwe	C82, C83	brak
62.	Mekinist	<i>Trametinib</i>	tabletki powlekane	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	I linia leczenia, terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)
63.	Metopirone	<i>Metyraponum</i>	kapsułki miękkie	Leczenie pacjentów z hiperkortyzolemią	E24.0, E24.3, E24.8, E24.9	leczenie endogennego zespołu Cushinga
64.	Myalepta	<i>Metreleptinum</i>	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Lipodystrofia	E88.1	brak
65.	Mylotarg	<i>Gemtuzumab ozogamycinum</i>	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	Ostra białaczka szpikowa	C92.0	W populacji pacjentów pediatrycznych >15 r.ż. ze wznową choroby (osoby z nawrotem choroby między 15 a 18 r.ż)
66.	Naglazyme	<i>Galsulfase</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux-Lamy)	E76.2	brak
67.	Nerlynx	<i>Neratinib</i>	tabletki powlekane	Rak piersi	C50	leczenie adjuwantowe
68.	Ocaliva	<i>Acidum obeticholicum</i>	tabletki powlekane	Pierwotne zapalenie dróg żółciowych	K74.3	leczenie pacjentów dorosłych, u których odpowiedź na leczenie kwasem ursodeoksycholowym (UDCA) jest niedostateczna lub w monoterapii u dorosłych z nietolerancją UDCA w ramach III linii leczenia (po UDCA i innym leczeniu brany pod uwagę w wytycznych klinicznych)

69.	Onivyde pegylated liposomal	<i>Irinotecani hydrochloridum trihydricum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Rak trzustki w stadium uogólnienia	C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.7, C25.8, C25.9	brak
70.	Opdivo	<i>Nivolumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Rak jelita grubego	C18-C20	w ramach I linii leczenia systemowego u pacjentów z rakiem jelita grubego miejscowo zaawansowanym (III stopień zaawansowania), z potwierdzoną niestabilnością mikrosatelitarną wysokiego stopnia lub zaburzeniami mechanizmów naprawy uszkodzeń DNA o typie niedopasowania (dMMR), poza możliwością leczenia operacyjnego - terapia skojarzona z ipilimumabem
71.	Opdivo	<i>Nivolumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Rak urotelialny	C65, C66, C67	miejscowo zaawansowany lub przerzutowy, nieoperacyjny rak urotelialny w populacji pacjentów dorosłych, po niepowodzeniu wcześniejszej terapii opartej na pochodnych platyny
72.	Ozurdex	<i>Dexamethasonum</i>	implant do ciała szklistego w aplikatorze	Zapalenie błony naczyniowej oka - część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa	H20.0, H30.0	brak

73.	Padcev	<i>Enfortumabum vedotini</i>	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	Rak urotelialny	C61, C65, C66, C67, C68	I linia leczenia raka urotelialnego w stadium miejscowego zaawansowania poza możliwościami miejscowego leczenia o charakterze radykalnym lub w stadium uogólnienia - terapia skojarzona z pembrolizumabem
74.	Raxone	<i>Idebenone</i>	tabletki powlekane	Leczenie dziedzicznej neuropatii wzrokowej Lebera (LHON)	H47.2	brak
75.	Respreeza	<i>Ludzki inhibitor alfa-1-proteinazy</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	Leczenie chorych z ciężkim niedoborem alfa-1-antytrypsyny i rozedmą płuc	J44.8, E88.0	
76.	Rinvoq	<i>Upadacitinib</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Atopowe zapalenie skóry	L20	w ramach leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry
77.	Rybrewant	<i>Amivantamab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Zaawansowany niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	z aktywującymi mutacjami insercyjnymi w eksonie 20 w genie kodującym receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), po niepowodzeniu terapii opartej na pochodnych platyny; w populacji pacjentów dorosłych; leczenie w monoterapii

78.	Rybrevant	<i>Amivantamab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	II i kolejne linie leczenia u dorosłych pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z delecjami w eksonie 19 lub substytucją p.L858R w eksonie 21 genu EGFR, po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia inhibitorem kinazy tyrozynowej EGFR 3. generacji - terapia skojarzona z karboplatiną i pemetreksedem
79.	Saphnelo	<i>Anifrolumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Toczeń rumieniowaty układowy	M32	leczenie uzupełniające u dorosłych pacjentów z aktywnym, seropozytywnym toczeniem rumieniowatym układowym o postaci umiarkowanej do ciężkiej pomimo zastosowania standardowego leczenia
80.	Sarclisa	<i>Isatuximab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Szpiczak plazmocytowy	C90.0	terapia skojarzona z karfilzomibem i deksametazonem u dorosłych pacjentów, którzy otrzymali wcześniej co najmniej 1-3 linie leczenia, z czynnością niewydolnością nerek w momencie rozpoczęcia terapii (eGFR <60 ml/min/1,73m <sup>2</sup> ) oraz w stanie sprawności wg ECOG 0-2)

81.	Sialanar	<i>Glycopyronium bromidum</i>	roztwór doustny	Mózgowe porażenie dziecięce	G80	leczenie objawowe ciężkiej postaci ślinotoku u dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat z mózgowym porażeniem dziecięcym
82.	Signifor	<i>Pasireotidum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Choroba Cushinga	E24.0	w populacji osób dorosłych, z potwierdzoną klinicznie i biochemicznie chorobą Cushinga, u których wykonanie zabiegu operacyjnego guza przysadki nie jest możliwe lub zakończyło się niepowodzeniem; <b>tylko dla leku w dawce 10mg</b>
83.	Skilarence	<i>Dimethylis fumaras</i>	tabletki	Łuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego	L40	w populacji pacjentów, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne
84.	Spevigo	<i>Spesolimab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Łuszczyca krostkowa uogólniona	L40.1	leczenie zaostrzeń uogólnionej łuszczycy krostkowej u pacjentów w wieku 12 lat i powyżej, z rozpoznaniem uogólnionej łuszczycy krostkowej z zaostrzeniem choroby o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego

85.	Spevigo	<i>Spesolimab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Łuszczycza krostkowa uogólniona	L40.1	zapobieganie zaostrzeniom uogólnionej łuszczycy krostkowej u pacjentów w wieku 12 lat i powyżej ze znaną i udokumentowaną historią uogólnionej łuszczycy krostkowej, z wynikiem GPPGA 0 lub 1, u których wystąpiło co najmniej jedno zaostrzenie choroby w okresie ostatniego roku
86.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
87.	Tecentriq	<i>Atezolizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Rak piersi	C50	potrójnie ujemny rak piersi; terapia skojarzona z nab-paklitakselem u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub rozsiałym procesem chorobowym, z ekspresją PD-L1 $\geq 1\%$ , którzy nie otrzymali terapii z powodu choroby rozsianej
88.	Tezspire	<i>Tezepelumab</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka	Leczenie chorych z ciężką postacią astmy	J45. J82	<b>finansowana ze środków publicznych jest postać leku we wstrzykiwaczu</b>

89.	Trepulmix	<i>Treplostinil</i>	roztwór do infuzji	Przewlekłe zakrzepowozatorowe nadciśnienie płucne	127, 127.0, 126	Leczenie zakrzepowozatorowego nadciśnienia płucnego CTEPH w monoterapii oraz w skojarzeniu z riocyguatem (IV klasa czynnościowa wg NYHA/WHO; w kolejnej linii leczenia pacjentów z II/III klasą czynnościową wg NYHA/WHO po niepowodzeniu lub nietolerancji terapii riocyguatem (RIO) oraz w terapii skojarzonej treprostynil z riocyguatem)
90.	Tysabri	<i>Natalizumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Stwardnienie rozsiane	G35	leczenie z zastosowaniem postaci leku podawanej podskórną, w populacji pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią choroby po niepowodzeniu terapii I rzutu oraz w populacji pacjentów z szybko rozwijającą się ciężką postacią choroby u pacjentów >12 r.ż.
91.	Uplizna	<i>Inebilizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego	G36.0	monoterapia dorosłych pacjentów uprzednio nieleczonych lub u których minął określony czas od wcześniejszego leczenia
92.	Verquvo	<i>Vericiguat</i>	tabletki powlekane	Przewlekła niewydolność serca	150	w populacji pacjentów dorosłych

93.	Vyloy	<i>Zolbetuximab</i>	proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji	Nowotwór złośliwy żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego	C16, C16.0	I linia leczenia dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym nieresekcyjnym lub przerzutowym HER2-ujemnym gruczolakorakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego, wykazującym obecność kładyny 18.2 (CLDN18.2) - terapia skojarzona z chemioterapią opartą na pochodnych fluoropirymidyny (5-fluorouracyl) i platyny (oksalipatyna lub kapecytabina - według schematu FOLFOX lub CAPOX)
94.	Vyndaqel	<i>Tafamidisum</i>	kapsułki miękkie	Kardiomiopatia w przebiegu amyloidozy transtyretynowej	E85	w leczeniu dziedzicznej lub typu dzikiego amyloidozy transtyretynowej u dorosłych pacjentów z kardiomiopatią
95.	Vyndaqel	<i>Tafamidisum</i>	kapsułki miękkie	Rodzinna transtyretynowa polineuropatia amyloidowa (TTR-FAP)	E85.1	
96.	Xgeva	<i>Denosumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Guz olbrzymiokomórkowy kości	D48.0	brak
97.	Xospata	<i>Gilteritinibi fumaras</i>	tabletki powlekane	Leczenie nawrotowej ostrej białaczki szpikowej gilteritynibem	C92.0	leczenie podtrzymujące remisję

98.	Xtandi	<i>Enzalutamidum</i>	kapsułki miękkie	Rak gruczołu krokowego	C61	leczenie choroby <b>opornej na kastrację</b> u chorych po wcześniejszym leczeniu octanem abirateronu oraz docetakselem, u których nie wystąpiła oporność krzyżowa
99.	Xtandi	<i>Enzalutamidum</i>	tabletki powlekane	Rak gruczołu krokowego	C61	leczenie choroby <b>opornej na kastrację</b> u chorych po wcześniejszym leczeniu octanem abirateronu oraz docetakselem, u których nie wystąpiła oporność krzyżowa
100.	Yervoy	<i>Ipilimumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Rak jelita grubego	C18-C20	w ramach I linii leczenia systemowego u pacjentów z rakiem jelita grubego miejscowo zaawansowanym (III stopień zaawansowania), z potwierdzoną niestabilnością mikrosatelitarną wysokiego stopnia lub zaburzeniami mechanizmów naprawy uszkodzeń DNA o typie niedopasowania (dMMR), poza możliwością leczenia operacyjnego - terapia skojarzona z niwolumabem
101.	Yervoy	<i>Ipilimumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Czerniak skóry lub błon śluzowych	C43	dotyczy II linii leczenia choroby w III lub IV stopniu zaawansowania; leczenie w monoterapii

102.	Yervoy	<i>Ipilimumab</i>	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	Rak przełyku	C15	I linia leczenia u pacjentów dorosłych z zaawansowanym, nieoperacyjnym, nawrotowym lub przerzutowym płaskonabłonkowym rakiem przełyku oraz ekspresją PD-L1 na komórkach guza wynoszącą $\geq 1\%$ , <b>terapia skojarzona z niwolumabem</b>
103.	Yescarta	<i>Axicabtagene ciloleucel</i>	dyspersja do infuzji, $0,4 \times 10^8 - 2 \times 10^8$ komórek w worku infuzyjnym	Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe	C82, C83, C85	terapia CAR-T w leczeniu dorosłych chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL), chłoniaka z komórek B o dużym stopniu złośliwości (HGBCL) lub transformowanego chłoniaka grudkowego (TFL), z nawrotem choroby w ciągu 12 miesięcy od zakończenia immunochemioterapii I linii lub choroba oporna na immunochemioterapię I linii, niekwalifikujących się do autoHSCT
104.	Zejula	<i>Niraparib</i>	kapsułki twarde	Leczenie chorych na raka jajnika, jajowodu lub raka otrzewnej	C56, C57, C48	leczenie podtrzymujące chorych na nawrotowego platynowrażliwego raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej
105.	Zolgensma	<i>Onasemnogene abeparvovecum</i>	roztwór do infuzji	Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) (ICD-10: G12)	G12	w zakresie pacjentów nieobjętych programem lekowym

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	4882526.18573716.19714819
Nazwa dokumentu	wykaz leków niefinansowanych_ratunkowy dostęp_052026.pdf
Tytuł dokumentu	wykaz leków niefinansowanych_ratunkowy dostęp_052026
Sygnatura dokumentu	PLD.4731.2.2026
Data dokumentu	2026-06-01
Skrót dokumentu	09CD5CC93F195F74B859C9B66F50715CAD71EF0D
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2026-06-01 12:43:54
Podpisane przez	Katarzyna Kacperczyk Podsekretarz Stanu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.132.31.31.

Data wydruku: 2026-06-01

Autor wydruku: Kurek Adam (Główny Specjalista)