

Posiadacz zezwolenia:

BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec,
tel.: +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf.com

**Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:**

BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, tel.: 22 570 99 99, fax:
22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com

**Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:**

...

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:

.....

TRINET P

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

alfa-cypermetyryna (środek z grupy pyretroidów) – **1,57 g/kg (0,157% w/w; 100 mg/m² siatki)**

Inne substancje:

Feromony wabiące kornika drukarza - **3 ml / dyspenser**

**Zezwolenie MRiRW nr R-206/2015 z dnia 11.12.2015 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-430/2019d z dnia 11.07.2019 r.**



Niebezpieczeństwo

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W pobliżu obszaru, na którym zastosowano środek lub bezpośrednio na produkcie, w widocznych miejscach, należy rozmieścić tablice informacyjne przestrzegające osoby postronne, aby bezwzględnie unikały kontaktu z produktem (siatką).

OPIS DZIAŁANIA

Trinet P jest środkiem owadobójczym, w postaci dwuskładnikowej pułapki (system „zwab i zabij”), do stosowania w leśnictwie, przeznaczonym do zwalczania kornika drukarza w drzewostanach iglastych.

Trinet P składa się z metalowego stelaża w kształcie trójnoga, na którym rozpięta jest siatka nasączona substancją czynną alfa-cypermetryną, związaną we wnętrzu włókien systemem polimerów wiążących. Wewnątrz trójnoga zawieszony jest dyspenser feromonu Pheroprax Ampułka przywabiający chrząszcze, które zwabione obsiadają siatkę i w wyniku kontaktu z nią giną (system „zwab i zabij”). Trinet P wykorzystywany jest do ochrony drzew rosnących (drzewostanu).

STOSOWANIE ŚRODKA

LEŚNICTWO

DRZEWOSTANY IGLASTE

Kornik drukarz (owady dorosłe)

Termin stosowania: Pułapki Trinet P stosuje się, gdy występuje zagrożenie porażenia drzewostanu kornikiem drukarzem (zasiedlone 10 m³ drewna na hektar). Pułapki zastosować przed rójką szkodnika.

Zalecana ilość pułapek na 1 lokalizację: 3 pułapki/100 mb ściany drzewostanu (6,6 m² siatki)
Maksymalna ilość pułapek na 1 ha chronionego lasu: 8 pułapek (17,6 m² siatki)

Powierzchnia siatki nasączonej alfa-cypermetryną na jednym stelażu wynosi 2,2 m².

SPOSÓB UŻYCIA

Montaż pułapek:

Pułapki są pakowane po 5 sztuk w kartonie, każdy komplet zawiera 3-częściowy, teleskopowy stelaż z aluminium w kształcie piramidy, siatkę nasączoną alfa-cypermetryną i 2 sztuki dyspensera feromonu Pheroprax Ampułka.

Elementy konstrukcji metalowej należy rozpakować i zmontować według zamieszczonego schematu, tak aby utworzyły piramidę. Siatkę należy rozpakować, nałożyć na konstrukcję i ponaciągać. Wewnątrz konstrukcji w połowie wysokości piramidy utworzonej z siatki należy za pomocą sznurka (w zestawie) zawiesić rozpakowany z folii dyspenser feromonu Pheroprax Ampułka. Drugi dyspenser feromonu należy przechować do czasu zastosowania w temperaturze do 5°C.

Całość należy solidnie wbić w grunt, wypoziomować.

W przypadku zakończenia sezonu wylotu kornika pułapkę można złożyć i wykorzystać ponownie. Pułapki Trinet P przeznaczone są do wielokrotnego użycia w sumie maksymalnie do 6 miesięcy.

Sposób użycia/rozmieszczenia pułapek:

W zagrożonej lokalizacji należy rozstawić trzy pułapki Trinet P w odległości 20-25 metrów jedna od drugiej oraz w odległości 8-12 metrów od ściany drzewostanu bądź zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Instrukcji Ochrony Lasu.

Odległość od ściany drzewostanu: 8-12 metrów

Odległość między pułapkami Trinet P: 20-25 metrów

Optymalną skuteczność zwalczania kornika drukarza można osiągnąć, jeśli lokalne warunki pozwalają na instalację co najmniej trzech pułapek Trinet P w opisanym powyżej układzie lub gdy średnica polan śródleśnych, na których są rozmieszczone pułapki, wynosi co najmniej 25 metrów.

UWAGI

1. Celem uniknięcia nieuzasadnionego zastosowania środka Trinet P wskazane jest monitorowanie populacji kornika drukarza np. przy pomocy pułapek feromonowych.
2. Przed montażem pułapki należy zapoznać się z etykietą.
3. Należy się upewnić, że metalowy stelaż pułapki jest zawsze w stabilnej poziomej pozycji. Teleskopowe nogi stelaża pozwalają dostosować położenie pułapki do nachylenia terenu oraz wysokości porastającej go roślinności. Należy przymocować stelaż do podłoża tak, aby uniemożliwić przewrócenie lub porwanie pułapki przez wiatr.
4. Na płaskim terenie należy okresowo usuwać roślinność wokół pułapki, aby uniknąć jej przerośnięcia.
5. Starannie zamontować siatkę na trójnogim stelażu i okresowo naciągać w razie potrzeby.
6. Dyspenser feromonu Pheroprax Ampułka zawiesić możliwie najbliżej środka pułapki.
7. Pułapki te wykazują aktywność owadobójczą przez 6 miesięcy i mogą być stosowane w niskich temperaturach, np. wczesną wiosną, jeszcze przed rójką korników.
8. Okres przydatności metalowego stelaża przy prawidłowym stosowaniu (montażu i demontażu) wynosi minimum 8 lat.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie montażu i rozmieszczania pułapek.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

W przypadku, gdy środek dostanie się na skórę (zwłaszcza twarzy) może spowodować zaczerwienienie lub świąd, bez zewnętrznych objawów podrażnionej skóry. Należy wówczas przerwać pracę i jeżeli powyższe objawy nie przemijają - zasięgnąć porady lekarza.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Przed rozstawieniem pułapek należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na ich działanie i które zwróciły się o taką informację.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

Zabrania się stosowania produktu na terenach, na których występują gatunki stawonogów wymienione w załączniku II lub IV do dyrektywy 92/43/EWG z dnia 1 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7, z późn. zm.).

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następnie:
nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- w temperaturze 0 - 30°C (siatka),
- w temperaturze do 5°C (dyspenser feromonu Pheroprax Ampułka).

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -