

Posiadacz zezwolenia:

Rudnikagro Sp. z o. o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin, tel.: +48 91 461 25 64,
fax. +48 91 460 03 50


TARRACCO 700 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

metamitron(związek z grupy triazynonów) – 700 g/l (58,24%)

**Zezwolenie MRiRW nr R - 150/2019z dnia 10.10.2019 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 566/2020d z dnia 24.08.2020 r.**

	
Uwaga	
H302 H410	Działa szkodliwie po połknięciu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401	W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P280 P301+P312 P391	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo i nalistnie, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy C1.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów fotosyntezy na poziomie fotosystemu II. Pierwsze objawy działania środka to występujące po kilku dniach od zastosowania żółknięcie, widoczne w przestrzeniach międzynerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach najstarszych liści. Następnie widoczne jest silne zahamowanie wzrostu i zasychanie rośliny. Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od kiełkowania do fazy liścieni.

Stosowanie środka pojedynczo

Chwasty wrażliwe:	gorczyca polna.
Chwasty średniowrażliwe:	gwiazdnica pospolita, rdest płamisty, rumianek pospolity.

Chwasty średnioopdorne:	komosa biała.
Chwasty odporne:	bodziszek drobny, fiołek polny.

Stosowanie środka w mieszaninie z adiuwantem Olbras 88 EC

Chwasty wrażliwe:	gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest plamisty rumianek pospolity.
Chwasty średniowrażliwe:	bodziszek drobny, fiołek polny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Burak cukrowy

Termin stosowania: środek stosować po wschodach roślin buraka od fazy 2 liści (BBCH 12) do fazy 8 liści (BBCH 18) w systemie dawek dzielonych według podanego poniżej schematu:

Pierwszy zabieg:

Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, na rośliny buraka w fazie 2 liści.

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Drugi zabieg:

Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, na rośliny buraka w fazie do 8 liści.

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Trzeci zabieg:

Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, na rośliny buraka w fazie do 8 liści.

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecenia ilość wody: 200 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

lub

W celu zwiększenia wrażliwości chwastów środek Tarracco 700 SC należy stosować w mieszaninie z adiuwantem Olbras 88 EC według poniższego schematu:

Pierwszy zabieg:

Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, na rośliny buraka w fazie 2 liści.

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha + Olbras 88 EC 1,0 l/ha.

Drugi zabieg:

Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, na rośliny buraka w fazie do 8 liści.

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha + Olbras 88 EC 1,0 l/ha.

Trzeci zabieg:

Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, na rośliny buraka w fazie do 8 liści.

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha + Olbras 88 EC 1,0 l/ha.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecenia ilość wody: 200 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH

*Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik*

Burak pastewny, burak ćwikłowy

Termin stosowania: środek stosować po wschodach roślin buraka od fazy 2 liści (BBCH 12) do fazy 8 liści (BBCH 18) w systemie dawek dzielonych według podanego poniżej schematu:

Pierwszy zabieg:

Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, na rośliny buraka w fazie 2 liści.

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Drugi zabieg:

Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, na rośliny buraka w fazie do 8 liści.

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Trzeci zabieg:

Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, na rośliny buraka w fazie do 8 liści.

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecenia ilość wody: 200 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

lub

W celu zwiększenia wrażliwości chwastów środek Tarracco 700 SC należy stosować w mieszaninie z adiuwantem Olbras 88 EC według poniższego schematu:

Pierwszy zabieg:

Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, na rośliny buraka w fazie 2 liści.

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha + Olbras 88 EC 1,0 l/ha.

Drugi zabieg:

Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, na rośliny buraka w fazie do 8 liści.

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha + Olbras 88 EC 1,0 l/ha.

Trzeci zabieg:

Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, na rośliny buraka w fazie do 8 liści.

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha + Olbras 88 EC 1,0 l/ha.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecenia ilość wody: 200 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Burak cukrowy, burak pastewny, burak ćwikłowy - nie wymagany

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Liści buraków traktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę dla zwierząt/ nie stosować jako paszy dla zwierząt.

Na plantacje buraków potraktowanych środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich przez 103 dni.

1. Zabieg wykonać najlepiej w czasie wilgotnej, ciepłej pogody, na rośliny suche, co najmniej na 6 godzin przed spodziewanym deszczem.
2. Strategia zarządzania odpornością
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
 - postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
 - dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
 - stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
 - stosować mieszkankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
 - stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
 - dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
 - używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
 - używać kwalifikowanego materiału siewnego,
 - czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
 - informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
 - w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
3. Środek nie stosować:
 - na stanowiskach, na których obserwowano wcześniej zmniejszoną skuteczność działania herbicydów zawierających substancje czynne z grupy C1 (tj. inhibitorów fotosyntezy) lub z innych grup chemicznych, ale o tym samym mechanizmie działania,
 - w warunkach silnego nasłonecznienia i wysokich temperatur powietrza (przekraczających 25°C) i długotrwałej suszy,
 - na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki,
 - na rośliny mokre,
 - w okresie spodziewanych przymrozków,
 - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
 - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
 - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następnie.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki (lub z innej przyczyny), na tym samym polu można uprawiać: w tym samym sezonie wegetacyjnym buraki.

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego do poziomu nie stwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następnie.

Przed uprawą roślin następnych zaleca się wykonanie w zespole uprawek przedsięwziętych orki na głębokość co najmniej 15 cm. Zboża ozime uprawiane w tym samym roku kalendarzowym powinny być wysiewane w odstępie co najmniej 16 tygodni od ostatniego zabiegu środkiem.

W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki (lub z innej przyczyny), na tym samym polu można uprawiać burak cukrowy i burak pastewny.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wleciu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

- jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą (kombinezon), w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W czasie gdy w uprawie występują kwitnące chwasty oraz w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc/lekarzem.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -