

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B

szczepienia 



CZYNNIK

Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV)



POWIKŁANIA

OBJAWY

OBJAWY MOGĄ BYĆ
NIETYPOWE LUB NIEOBECNE,
DLATEGO U CZĘŚCI OSÓB
ZAKAŻENIE HBV
JEST WYKRYWANE
PO WIELU LATACH!

- złe samopoczucie
- brak apetytu
- nudności
- wymioty
- ból brzucha
- żółtaczka
- osłabienie
- zmęczenie

- ostra niewydolność wątroby
- marskość wątroby
- pierwotny rak wątroby



SZCZEPIONKA INAKTYWOWANA ZAWIERA BIAŁKO WIRUSA HBV

- dzieci z masą urodzeniową <2000 g: 4 dawki (schemat 3+1)
- dzieci z masą urodzeniową >2000 g: 3 dawki w schemacie 0-1-6 miesięcy
- dorośli niezaszczepieni: 3 dawki w schemacie 0-1-6 miesięcy

PROFILAKTYKA

NIE MA SKUTECZNEGO LECZENIA WZW B

EPIDEMIOLOGIA

DROGI ZAKAŻENIA:

- kontakt z krwią
- kontakty seksualne
- z zakażonej matki na dziecko (w czasie ciąży lub w czasie porodu)
- zabiegi medyczne/kosmetyczne z użyciem niesterylnego sprzętu

ZACHOROWANIA

każda osoba nieuodporniona może ulec zakażeniu

zakażenie może przebiegać pod postacią ostrą lub przewlekłą

zakażenie z ryzykiem przejścia w postać przewlekłą:

- 90%** w wieku niemowlęcym (pierwszym roku życia)
- 6-10%** u starszych dzieci i dorosłych

OD 1996 R.

liczba zachorowań systematycznie malała, po wprowadzeniu powszechnych szczepień dzieci, po zaostrzeniu przepisów dotyczących sterylizacji sprzętu medycznego oraz w innych dziedzinach, gdzie dochodzi do kontaktu z krwią.