

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -579/2016d z dnia 19.12.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 79/2015 z dnia 05.05.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:

COMPO Polska Sp. z o.o., pl. Wiosny Ludów 2, 61 – 831 Poznań, tel. +48 61 850 93 85, fax:
+48 61 850 93 81

COMPO 2w1 Nawóz do trawników z odchwaszczaczem

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

dikamba (substancja z grupy pochodnych kwasu benzoesowego w formie soli dimetyloaminowej) - **1,6 g/kg (0,16%)**

2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) w formie soli dimetyloaminowej) – **3,3 g/kg (0,33%)**

Zawartość składników nawozowych:

azot ogólny – 15%

azot amonowy – 2,0%

azot azotanowy – 7,4%

azot mocznikowy – 5,1%

fosfor (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie – 5%

potas (K_2O) rozpuszczalny w wodzie – 8%

magnez (MgO) – 3%

**Zezwolenie MRiRW nr R- 79/2015 z dnia 05.05.2015 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 128/2016d z dnia 26.02.2016 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 579/2016d z dnia 19.12.2016 r.**

EUH 208 - Zawiera 2,4-D i metylomocznik. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH 401– W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

OPIS DZIAŁANIA

Środek chwastobójczy z nawozem w formie granul do posypywania, stosowany nalistnie w amatorskiej uprawie roślin, przeznaczony do powszechnego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych na trawnikach w ogrodach przydomowych i działkowych.

Dodatek długotrwale działających składników pokarmowych zaspokaja wszystkie ważne potrzeby pokarmowe traw wchodzących w skład trawnika.

Środek przeznaczony do stosowania ręcznie lub przy użyciu siewników do nawozów.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest przez liście chwastów, powodując deformację i zahamowanie wzrostu roślin dwuliściennych.

Chwasty wrażliwe: babka lancetowata, koniczyna czerwona, mleczeń polny, mniszek pospolity,

Chwasty średnio wrażliwe: babka zwyczajna, bluszczyk kurdybanek, dąbrowka rozłogowa, głowienka pospolita, jaskier rozłogowy, koniczyna biała, krwawnik pospolity, stokrotka polna,

Etykieta środka ochrony roślin COMPO 2w1 Nawóz do trawników z odchwaszczaczem – załącznik do zezwolenia MRiRW

Chwasty średnio odporne: komonica zwyczajna,
Chwasty odporne: bodziszek łąkowy, koniczyna polna, pięciornik rozłogowy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Trawniki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/m²

Środek stosować na trawniki i murawy w ogrodach przydomowych i działkowych.

Termin stosowania: Środek można stosować od maja do sierpnia, przy temperaturze powietrza powyżej 14°C.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

SPOSÓB STOSOWANIA

Przed zastosowaniem środka skosić trawnik. Odczekać 3-4 dni do czasu, gdy chwasty odrosną. Zastosować środek w czasie bezdeszczowej pogody rano, gdy trawa jest mokra od rosy lub podlać trawnik krótko przed zastosowaniem środka.

Środek rozsypywać równomiernie ręcznie lub przy użyciu siewnika do nawozów.

Nie wchodzić na trawnik bezpośrednio po wykonaniu zabiegu.

Odczekać 1-2 dni do chwili, gdy liście chwastów zaczną wykazywać objawy działania środka.

Podlać trawnik w odpowiedni sposób, jeśli w ciągu 2-3 dni po wykonaniu zabiegu nie wystąpił opad deszczu.

Trawę można ponownie kosić nie wcześniej niż po 7 dniach od zastosowania środka.

W razie wystąpienia większych placów gołej powierzchni po zwalczeniu chwastów środkiem COMPO 2w1 Nawóz do trawników z odchwaszczaczem, możliwe jest ponowne zasianie trawy w tych miejscach, nie wcześniej niż 4 tygodnie po wykonaniu zabiegu. Przed dosiewaniem trawy usunąć mechanicznie martwe chwasty. Wschody nowo zasianej trawy mogą zależeć od zastosowanej odmiany oraz lokalnych warunków.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Środka nie stosować na nowo założonych trawnikach w pierwszym roku po założeniu.

Środka nie stosować w czasie wietrznej pogody, w czasie przymrozków oraz w okresach suszy.

Środka nie stosować w temperaturze powietrza jest niższa niż 14°C.

Unikać ponownego rozsiewania środka na powierzchnię uprzednio potraktowaną oraz zawyżania dawki.

Środek nie powinien przedostać się na rośliny wrażliwe, takie jak rośliny ozdobne, w tym kwiaty, warzywa itp.

Nie rozsiewać na powierzchnie brukowane, z uwagi na możliwość trwałego zabrudzenia.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

W pierwszym roku po zastosowaniu środka trawą z pokosów nie karmić zwierząt.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następnie:

Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- wyłącznie w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- w temperaturze 0 - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradzić się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 1 rok

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -579/2016d z dnia 19.12.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 79/2015 z dnia 05.05.2015 r.