

Posiadacz zezwolenia:

COMPO GmbH & Co KG, Gildenstrasse 38, 48157 Münster, Republika Federalna Niemiec,
tel.: +49 251 32 77-0, fax: +49 2513 2 62 25, e-mail: info@compo.de

**Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:**

COMPO Polska Sp. z o.o., Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, tel.: 61 850 93 66, fax: 61
850 93 67.

COMPO NAWÓZ DO TRAWNIKÓW Z ODCHWASZCZACZEM

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

2,4-D (substancja z grupy fenylot kwasów) – **7 g/kg (0,70%)**.

dikamba (substancja z grupy pochodnych kwasu benzoowego) – **1 g/kg (0,10%)**.

EUH208 – Zawiera 2,4-D. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zezwolenie MRiRW nr R - 30/2014 z dnia 03.03.2014 r.
Zmienione decyzją MRiRW nr R - 73/2016d z dnia 02.02.2016 r.

P280 – Stosować rękawice ochronne.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

OPIS DZIAŁANIA

COMPO nawóz do trawników z odchwaszczaczem jest środkiem chwastobójczym występującym w postaci granul do posypywania. Przeznaczony jest do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych na trawnikach. Dodatek długotrwale działających składników pokarmowych w ilości: azot ogólny – 15%, azot amonowy – 2,3 %, azot azotanowy - 8,2 %, azot mocznikowy - 4,5 %, fosfor (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie – 5 % , potas (K_2O) rozpuszczalny w wodzie - 8%, magnez (MgO) -3 % umożliwia zarastanie trawą miejsc po obumarłych chwastach.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

COMPO nawóz do trawników z odchwaszczaczem pobierany jest przez liście chwastów powodując deformację i zahamowanie wzrostu roślin dwuliściennych. Najskuteczniej zwalcza chwasty w fazie 2-6 liści właściwych.

Chwasty wrażliwe: jaskier polny, krwawnik pospolity, mchy, powój polny, przetacznik bluszczykowaty, koniczyna biała.

Chwasty średniowrażliwe: babka lancetowata, przetacznik polny.

Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, skrzyp polny.

STOSOWANIE ŚRODKA

TRAWNIKI

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/m²

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środek można stosować od początku maja do końca sierpnia tak długo jak rosną chwasty, a temperatura nie spada poniżej 15°C. Środek najlepiej aplikować na trawę wilgotną od rosy, nie należy podlewać trawnika przed zastosowaniem środka.

Środek rozsypać równomiernie po 3-4 dniach od skoszenia trawnika. Środek stosować przy bezwietrznej pogodzie lub w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru. Trawnik podlać, w przypadku gdy przez 1-2 dni po zastosowaniu środka nie spadł deszcz.

Środek rozsypać ręcznie, stosując środki ochrony osobistej/rękawice lub używając rozsiewacza.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

- nie wchodzić na trawnik bezpośrednio po zastosowaniu środka;
- martwe chwasty usuwać mechanicznie;
- środek można stosować najwcześniej po roku wzrostu trawy;
- po zastosowaniu środka wstrzymać się przez 8 tygodni z wysiewem nasion trawy w celu odnowienia trawnika.

PRZECIWSKAZANIA

1. Środka nie stosować:
 - na nowo założonych trawnikach,
 - w temperaturze poniżej 10°C i powyżej 25°C.
2. Trawę z trzech pierwszych pokosów po zastosowaniu środka nie wolno dodawać do kompostu ani karmić nią zwierząt.
3. Środek można stosować dopiero gdy liście roślin cebulowych uprawianych współrzędnie na trawniku są całkowicie obumarłe.
4. Środek nie powinien przedostać się na rabaty albo w pobliże korzeni drzew i krzewów.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne (nitrylowe).

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następnie:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- w temperaturze 0 °C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradzić się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -