

Załącznik do pozwolenia MRiRW nr R - 68/2013h.r. z dnia 02.10. 2013 r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:

Agchemaccess Polska Sp. z o.o., ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz,
tel. +48 52 381 49 14, fax: +48 52 381 49 14

**Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

D Y M A S

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

iprodion (związek z grupy dikarboksymidów) – **500 g/l (42,91%)**.

Pozwolenie MRiRW nr R-68/2013h.r. z dnia 02.10.2013 r.



Xn Szkodliwy



Szkodliwy

Niebezpieczny dla środowiska

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I. OPIS DZIAŁANIA

Dymas jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie czereśni, wiśni, borówki wysokiej, maliny, truskawki, winorośli, kapusty głowiastej, kapusty pekińskiej, marchwi, pasternaku, cebuli, szalotki, czosnku, brokuła, kalafiora, kapusty brukselki, fasoli szparagowej, groszku zielonego, bobu, bobiku, szparagów, uprawianych w gruncie: pomidora, papryki, bakłażana, pepino, ogórka, cukinii, patisona, sałaty, endywii, roślin ozdobnych oraz drzew i krzewów ozdobnych, uprawianych pod osłonami: pomidora, papryki, bakłażana, pepino, ogórka, cukinii, sałaty, fasoli szparagowej i roślin ozdobnych oraz cebul tulipanów i bulw mieczyków przed chorobami grzybowymi

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.

II. ZASTOSOWANIE ŚRODKA

1. Kapusta głowiasta (przeznaczona do długotrwałego przechowywania).

Czerń krzyżowych.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 - 1,0 l/ha.

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 - 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.

Zabiegi wykonać pod koniec okresu wegetacji kapusty.

Ostatni zabieg wykonać na 14 dni przed zbiorem kapusty.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

2. Kapusta pekińska

Czerń krzyżowych.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 - 1,0 l/ha.

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 - 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

Zabiegi wykonać pod koniec okresu wegetacji kapusty.

Ostatni zabieg wykonać na 14 dni przed zbiorem kapusty.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

3. Malina

Szara pleśń, zamieranie pędów.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha.

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 - 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Środek stosować nie częściej niż dwa razy w sezonie.

Pierwszy zabieg wykonać na początku kwitnienia. Następne zabiegi, w tym stosując inne fungicydy o innym mechanizmie działania, wykonać w odstępach co 10 dni z zachowaniem okresu karencji.

Przy dużym zagrożeniu chorobowym zaleca się wykonanie 1-2 zabiegów w sezonie po zbiorze owoców.

Uwaga:

Wskazane jest dodanie środka zwiększającego równomierność pokrycia roślin cieczą użytkową.

4. Truskawka

Szara pleśń.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 – 2,0 l/ha.

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 - 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Uwagi:

Wyższe dawki stosować w okresach zwiększonego zagrożenia chorobą.

Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

Krótsze odstępy między zabiegami zachować w przypadku większego zagrożenia występowania chorób.

Ograniczyć stosowanie środka w przypadku silnego zagrożenia wystąpieniem szarej pleśni.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

1. Marchew.

Alternarioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Środek stosować od fazy liścieni do fazy gdy korzeń osiągnie typową wielkość i kształt.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

2. Pasternak.

Alternarioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Środek stosować od fazy liścieni do fazy gdy korzeń osiągnie typową wielkość i kształt.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

3. Cebula, szalotka.

Zgnilizna szyjki cebuli, szara pleśń.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Środek stosować od fazy 3-go liścia do fazy zbioru cebuli.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

4. Czosnek.

Zgnilizna szyjki cebuli, szara pleśń.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Środek stosować od fazy 3-go liścia do fazy zbioru czosnku.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

5. Brokuł.

Szara pleśń, czerń krzyżowych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Środek stosować od początku rozwoju główki do końca fazy gdy róża osiągnie typową wielkość i kształt.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

6. Kalafior.

Szara pleśń, czerń krzyżowych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Środek stosować od początku rozwoju główki do końca fazy gdy róża osiąga typową wielkość i kształt.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

7. Kapusta brukselka.

Szara pleśń, czerń krzyżowych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Środek stosować od początku rozwoju główki do fazy gdy główka osiąga 80% typowej wielkości.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

8. Pomidor uprawiany w gruncie.

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Środek stosować od początku fazy pierwszego kwiatostanu do końca fazy gdy owoce osiągają typową wielkość i kształt.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

9. Papryka uprawiana w gruncie.

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Środek stosować od początku fazy drugiego pąka kwiatowego do końca fazy gdy owoce osiągają typową wielkość i kształt.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

10. Bakłażan, pepino uprawiane w gruncie.

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Środek stosować od początku fazy drugiego pąka do końca fazy gdy owoce osiągają typową wielkość i kształt.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

11. Ogórek uprawiany w gruncie.

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 12 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Środek stosować od fazy drugiego pąka kwiatowego do końca fazy gdy 50% owoców uzyskuje typową wielkość i kształt.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

12. Cukinia uprawiana w gruncie.

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 12 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Środek stosować od fazy drugiego pąka kwiatowego do końca fazy gdy 50% owoców uzyskuje typową wielkość i kształt.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

13. Patison uprawiany w gruncie.

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 12 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Środek stosować od fazy drugiego pąka kwiatowego do końca fazy gdy 50% owoców uzyskuje typową wielkość i kształt.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

14. Fasola szparagowa.

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.

Środek stosować w fazie kwitnienia fasoli.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

15. Bób.

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2.**

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.

Środek stosować w fazie kwitnienia bobu.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

16. Groszek zielony.

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **1.**

Zabieg wykonać w okresie kwitnienia grochu.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

17. Sałata, endywia.

Szara pleśń, rizoktonioza, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2.**

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 – 21 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Środek stosować od fazy 5-tego liścia do końca fazy gdy rozeta osiąga 50% średnicy typowej dla odmiany.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

18. Szparag.

Szara pleśń.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2.**

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.

Ochronę prowadzić po zbiorach wypustek, w czasie wzrostu pędów. Pierwszy zabieg wykonać po pojawieniu się objawów choroby (najczęściej na przełomie lipca i sierpnia).

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

19. Pomidor uprawiany pod osłonami.

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody).

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Środek stosować od początku fazy rozwoju pierwszego kwiatostanu do końca fazy gdy owoce osiągają typową wielkość i kształt.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

20. Papryka uprawiana pod osłonami.

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody).

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Środek stosować od początku fazy drugiego pąka kwiatowego do końca fazy gdy owoce osiągają typową wielkość i kształt.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

21. Bakłażan, pepino uprawiane pod osłonami.

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody).

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Środek stosować od początku fazy drugiego pąka kwiatowego do końca fazy gdy owoce osiągają typową wielkość i kształt.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

22. Ogórek uprawiany pod osłonami.

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody).

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody).

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 12 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Środek stosować od fazy drugiego pąka kwiatowego do końca fazy gdy 50% owoców uzyskuje typową wielkość i kształt.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

23. Cukinia uprawiana pod osłonami.

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody).

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody).

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 12 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Środek stosować od fazy drugiego pąka kwiatowego do końca fazy gdy 50% owoców uzyskuje typową wielkość i kształt.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

24. Sałata uprawiana pod osłonami.

Szara pleśń, rizoktonioza, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 – 21 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Środek stosować od fazy 5-tego liścia do końca fazy gdy rozeta osiąga 50% średnicy typowej dla odmiany.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

25. Fasola szparagowa uprawiana pod osłonami.

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo na początku okresu kwitnienia.

Środek stosować w fazie kwitnienia fasoli.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

26. Bobik.

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.

Środek stosować w fazie kwitnienia bobiku.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

27. Czereśnia, wiśnia.

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha 0,15% tj. 150 ml/100 l wody).

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha 0,15% tj. 150 ml/100 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać na początku kwitnienia (w okresie rozchylania się pierwszych pąków), następny zabieg wykonać w pełni kwitnienia.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 500-850 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

28. Borówka wysoka.

Szara pleśń.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha (0,15% tj. 150 ml/100 l wody).

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha (0,15% tj. 150 ml/100 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać na początku okresu kwitnienia.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

29. Winorośl.

Szara pleśń.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha (0,15% tj. 150 ml/100 l wody).

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha (0,15% tj. 150 ml/100 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać na początku okresu kwitnienia.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

30. Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami.

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2% (0,2 l/100 l wody).

Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2% (0,2 l/100 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 8 – 14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

31. Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami.

Alternarioza.

Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody).

Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 8 – 14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

32. Drzewa i krzewy ozdobne.

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych.

Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2% (0,2 l/100 l wody).

Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2% (0,2 l/100 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 8 – 14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać na początku kwitnienia.

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

33. Tulipan.

Szara pleśń.

Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2% (0,2 l/100 l wody).

Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2% (0,2 l/100 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebule tulipanów zanurzyć w roztworze środka na 15 minut. Zabieg wykonać tuż przed sadzeniem cebul.

34. Mieczyk.

Szara pleśń, sucha zgnilizna mieczyków.

Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 1% (1 l/100 l wody).
Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 1% (1 l/100 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Bulwy mieczyków zanurzyć w roztworze środka na 15 minut. Zabieg wykonać tuż przed sadzeniem bulw.

III. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

Nie dotyczy.

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

Nie dotyczy.

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

Uprawa gruntowa:

- truskawka - 2 dni,
- pomidor, papryka, bakłażan, pepino, ogórek, cukinia, patison, czereśnia, wiśnia, malina, borówka wysoka - 3 dni,
- kapusta głowiasta, kapusta pekińska, brokuł, kalafior, kapusta brukselska, fasola szparagowa, bób, bobik - 14 dni,
- cebula, szalotka, czosnek, groszek zielony, sałata, endywia, winorośl - 21 dni,
- marchew, pasternak - 28 dni.

Uprawa pod osłonami:

- pomidor, papryka, bakłażan, pepino, ogórek, cukinia, fasola szparagowa - 3 dni,
- sałata - 14 dni,
- szparag, rośliny ozdobne, tulipan, mieczyk, drzewa i krzewy ozdobne - nie dotyczy.

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy.

5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

Nie dotyczy.

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN

Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin w własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie:

- strefy ochronnej o szerokości 7 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy maliny, borówki amerykańskiej i winorośli,
- strefy ochronnej o szerokości 8,4 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy kapusty pekińskiej, marchwi, pasternaku, szparagów, cebuli, szalotki, czosnku, brokułów, kalafiora, kapusty brukselskiej, sałaty, endywii, roślin ozdobnych, drzew i krzewów ozdobnych,
- strefy ochronnej o szerokości 12, 1 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy truskawki, pomidora, papryki, bakłażana, pepina, ogórka, cukinii, patisona, fasoli szparagowej, groszku zielonego, bobu,
- strefy ochronnej o szerokości 25 m od zbiorników i cieków wodnych w uprawie czereśni i wiśni.

V. POMOC MEDYCZNA

W przypadku połknięcia natychmiast wypluć usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem. Nie należy wywoływać wymiotów ani nie podawać nic doustnie w przypadku, gdy ofiara jest nieprzytomna lub ma drgawki.

Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych).

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04
Kraków – (12) 411 99 99
Lublin – (81) 740 89 83
Łódź – (42) 657 99 00
Poznań – (61) 847 69 46

Rzeszów – (17) 866 40 25
Sosnowiec – (32) 266 11 45
Tarnów – (14) 631 51 77
Warszawa – (22) 619 66 54
Wrocław – (71) 343 30 08.

VI. PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 40°C, z dala od źródeł ciepła.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -