

Posiadacz zezwolenia:

CIECH Sarzyna S., A., ul. Chemików 1, 37 - 310 Nowa Sarzyna, tel.: 17 24 07 111, fax: 17 24 07 122, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com, www.ciechgroup.com

Ekonom Duo 72,5 WP

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) - **680 g/kg (68%)**

cymoksanil (związek z grupy monoacetylomoczników) **45 g/kg (4,5%)**

Zezwolenie MRiRW nr R - 58/2014 z dnia 16.04.2014 r.

Zmienione decyzją MRiRW nr R-440/2015d z dnia 27.05.2015 r.



UWAGA

H317-Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319- Działa drażniąco na oczy.

H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H411- Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401-W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P280- Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302-P352-W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem

P305+351+338- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P308+P313- W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P337+P313-W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P 391 Zebrać wyciek

OPIS DZIAŁANIA

Ekonom Duo 72,5 WP jest środkiem grzybobójczym o działaniu wgłębnym i powierzchniowym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka, pomidora, ogórka i cebuli przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych (w uprawie ziemniaka, pomidora w uprawie polowej, ogórka w uprawie polowej i cebuli) i ręcznych (w uprawie pod osłonami pomidora i ogórka).

STOSOWANIE ŚRODKA

ZIEMNIAK

Zaraza ziemniaka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha

Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:

- na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w rzędach,
- na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub środkiem Ekonom Duo 72,5 WP, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-14 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Krótsze odstępy między zabiegami (7-10 dni) zachować w warunkach większego zagrożenia patogenem oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: 7 – 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

POMIDOR (W UPRAWIE POLOWEJ)

Zaraza ziemniaka, alternarioza, antraknoza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,4 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,4 kg/ha

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na pomidorach lub ziemniakach w danym rejonie. Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: 7 – 10 dni

Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

POMIDOR (W UPRAWIE POD OSŁONAMI)

Zaraza ziemniaka

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% - 300 g środka w 100 l wody

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% - 300 g środka w 100 l wody

Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym, co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: 7 – 10 dni

Zalecana ilość wody: 1200 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

OGÓREK (W UPRAWIE POLOWEJ)

Mączniak rzekomy dyniowatych

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3 kg/ha

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na plantacjach w danym rejonie. Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym co 7 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

OGÓREK (W UPRAWIE POD OSŁONAMI)

Mączniak rzekomy dyniowatych

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% - 300 g środka w 100 l wody

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% - 300 g środka w 100 l wody

Środek stosować 1-2 razy w sezonie wegetacyjnym co 7 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 1200 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

CEBULA

Mączniak rzekomy cebuli, alternarioza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 – 2,5 kg/ha

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej, uprawianej z dymki lub siewu ozimego w danym rejonie. Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym, w odstępach co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Należy także zapewnić jak najlepsze pokrycie całych roślin cieczą użytkową stosując np.: rozpylacze z podwójnymi otworami opryskowymi, systemy podwójnych rozpylaczy, opryskiwacze z pomocniczym strumieniem powietrza.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: 7 – 10 dni.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

UWAGI:

1. Krótsze odstępy między zabiegami zachować w przypadku większego zagrożenia chorobą.
2. Wyższe z zalecanych dawek stosować w uprawach silnie wyrosniętych lub w warunkach większego zagrożenia chorobami.
3. W przypadku stosowania środka w uprawach pod osłonami stosować sztuczne podłoża (brak kontaktu produktu z glebą).

SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wleciu cieczy użytkowej do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu oraz z wodą użytą do mycia aparatury należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
Stosować rękawice ochronne/okulary lub ochronę twarzy, odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

- 15 m w uprawie ziemniaków.

- 20 m w uprawie pomidorów.
- 25 m w uprawie ogórków.
- 16 m w uprawie cebuli.

od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku uprawy ziemniaka, pomidora w uprawie polowej, ogórka w uprawie polowej oraz cebuli, w celu ochrony stawonogów pożytecznych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 metra od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

ziemniak - 11 dni,
pomidor - 4 dni,
ogórek - 3 dni,
cebula - 14 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następnie: nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- w temperaturze 0°C-30°C,.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -

W przypadku choroby rośliny, przed zastosowaniem środka należy dokładnie zbadać roślinę i określić rodzaj choroby. Środek stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Nie stosować w pobliżu zbiorników wodnych i terenów zielonych.

Środek jest substancją toksyczną. Stosować go należy z zachowaniem środków ostrożności. Nie wdychać pyłu, nie wdychać oparów. Nie dotykać oczu, skóry i błon śluzowych.

Środek jest substancją łatwopalną. Stosować go należy z zachowaniem środków ostrożności. Nie palić, nie używać otwartego ognia. Nie stosować w pobliżu źródeł ciepła.

Środek jest substancją drażniącą. Stosować go należy z zachowaniem środków ostrożności. Nie wdychać pyłu, nie wdychać oparów. Nie dotykać oczu, skóry i błon śluzowych.

Środek jest substancją szkodliwą dla zwierząt. Stosować go należy z zachowaniem środków ostrożności. Nie stosować w pobliżu zwierząt.

WAZNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA
Środek jest substancją szkodliwą dla zwierząt. Stosować go należy z zachowaniem środków ostrożności. Nie stosować w pobliżu zwierząt.

Środek jest substancją szkodliwą dla zwierząt. Stosować go należy z zachowaniem środków ostrożności. Nie stosować w pobliżu zwierząt.

Środek jest substancją szkodliwą dla zwierząt. Stosować go należy z zachowaniem środków ostrożności. Nie stosować w pobliżu zwierząt.

Środek jest substancją szkodliwą dla zwierząt. Stosować go należy z zachowaniem środków ostrożności. Nie stosować w pobliżu zwierząt.

WYKAZ SUBSTANCJI AKTYWNYCH
Środek jest substancją szkodliwą dla zwierząt. Stosować go należy z zachowaniem środków ostrożności. Nie stosować w pobliżu zwierząt.