

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2016 z dnia 08.09.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:

Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim, Republika Federalna Niemiec,
tel.: +49 2173 387 225, fax: +49 2173 383 735

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: 22 572 35 00, fax: 22 572 36 03

EMESTO PRIME 050 FS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

penflufen (związek z grupy karboksyanilidów) - **50 g/l** (4,85%)

Zezwolenie MRiRW Nr R- 195 /2016 z dnia 08.09.2016 r.



Uwaga

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 - Zawiera 1,2-Benzoizotiazolin-3-on,5-chloro-2-metylo-izotiazol-3-on/2-metylo-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Emesto Prime 050 FS jest fungicydem w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym i układowym do zaprawiania bulw sadzeniaków ziemniaka przed rizoktoniozą. Środek do stosowania przy użyciu profesjonalnych urządzeń przeznaczonych do nanoszenia zapraw płynnych na bulwy sadzeniaków ziemniaka.

Etykieta środka ochrony roślin Emesto Prime 50 FS, załącznik do zezwolenia MRiRW

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

rizoktonioza ziemniaka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
40 ml w 1-1,5 l wody na 100 kg sadzeniaków.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (co 3 lata)

Termin stosowania:

Środek stosować do mokrego zaprawiania bulw sadzeniaków ziemniaka na krótko przed lub w trakcie sadzenia.

Do zaprawiania używać profesjonalnych urządzeń przeznaczonych do nanoszenia zapraw płynnych na bulwy sadzeniaków ziemniaka.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Zaprawione sadzeniaki mogą być użyte wyłącznie do sadzenia, nie wolno przeznaczać ich na cele konsumpcyjne ani na paszę.
2. Worków, w których przechowywane były zaprawione ziemniaki, nie można wykorzystywać ponownie do przechowywania żywności lub pasz.
3. Maksymalna norma sadzenia bulw zaprawionych środkiem Emesto Prime 050 FS wynosi 4 t/ha .

TECHNIKA ZAPRAWIANIA BULW

Ściśle przestrzegać zalecanej dawki środka.

Sadzeniaki zaprawiać przed lub w trakcie sadzenia.

Zaprawianie przed sadzeniem przeprowadzać na podajniku taśmowym lub rolkowym przy użyciu urządzeń specjalnie do tego przeznaczonych, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

Zaprawianie w trakcie sadzenia wykonywać przy użyciu zaprawiarek montowanych na sadzarkę do ziemniaków lub w sadzarkach wyposażonych fabrycznie w takie urządzenia.

Właściwa ilość zawiesiny na 1 tonę sadzeniaków: 10-15 litrów.

SPORZĄDZANIE ZAWIESINY

Przed przystąpieniem do sporządzania zawiesiny dokładnie ustalić jej ilość. Odmierzoną ilość wody wlać do zbiornika urządzenia zaprawiającego, włączyć mieszadło hydrauliczne i wlać odmierzoną ilość środka. Po wlaniu środka do zbiornika urządzenia ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami zawiesiny oraz z wodą użytą do mycia zaprawiarki należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

- zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wyczyścić zgodnie z instrukcją danego urządzenia.

Etykieta środka ochrony roślin Emesto Prime 50 FS, załącznik do zezwolenia MRiRW

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania zawiesiny oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Nie stosować na tym samym polu tego lub żadnego innego produktu zawierającego penflufen częściej niż co 3 lata.

W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:

- zaprawione sadzeniaki muszą być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione sadzeniaki są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,
- zebrać przypadkowo rozsypane sadzeniaki.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- w temperaturze 0 °C - 30 °C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Etykieta środka ochrony roślin Emesto Prime 50 FS, załącznik do zezwolenia MRiRW

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -.....

Zawartość netto -.....

Nr partii -.....