

Załącznik do pozw. MRiRW nr R -45/2013h.r. z dnia 01.08.2013 r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy :

Agriconcept Sp. z o.o. Sp. K., ul. Cicha 16, 62-561 Ślesin, tel: 48 669 555 807, fax:48 632 202 313, e-mail: office@agriconcept.pl

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.**

F L U R O F E N 480 SC

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie lub doglebowo, przeznaczony do zwalczania chwastów (głównie dwuliściennych) w cebuli i warzywach kapustnych.

Zawartość substancji aktywnej:

oksyfluorofen (związek z grupy dwufenyloeterów) – 480 g 1 litrze środka (40,3 %)

Pozwolenie MRiRW Nr R -45/2013h.r. z dnia 01.08.2013 r.



Niebezpieczny dla środowiska

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



Uwaga!

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.**

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek kontaktowy o działaniu dogłębowym i nalistnym.

Tworzy warstewkę na powierzchni gleby dzięki czemu kielkujące chwasty zamierają stykając się ze środkiem. Bezpośredni kontakt środka z liśćmi rosnących chwastów powoduje również ich zamieranie.

Chwasty wrażliwe np.: fiołek polny, gorczyca polna, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty odporne np.: gwiazdnica pospolita, mlecz polny.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny warzywne

- cebula z siewu

Środek można stosować:

1. w dawkach dzielonych:

trzykrotnie, w dawce 0,05 l/ha - pierwszy zabieg w fazie 1-2 liści cebuli, drugi zabieg w 7-10 dni po pierwszym zabiegu, trzeci zabieg w 7-10 po drugim zabiegu.

W celu zwiększenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów a szczególnie zwalczania ostrożeń polnego Flurofen 480 SC można stosować łącznie ze środkiem Lontrel 300 SL w dawce:

I zabieg – Flurofen 480 SC 0,05 l/ha + Lontrel 300 SL 0,1 l/ha

II zabieg – Flurofen 480 SC 0,05 l/ha + Lontrel 300 SL 0,15 l/ha

III zabieg – Flurofen 480 SC 0,05 l/ha + Lontrel 300 SL 0,15 l/ha

dwukrotnie, pierwszy zabieg w fazie 2 liści cebuli w dawce 0,1 l/ha, zabieg powtórzyć po 10 dniach stosując dawkę 0,15 l/ha

Uwaga

Środek w dawkach dzielonych (0,05-0,15 l/ha) stosować tylko na chwasty w fazie liścieni do fazy 1 pary liści, najlepiej uzupełniając po innych herbicydach zastosowanych wcześniej.

2. jednorazowo

od fazy 3-4 liści cebuli

-Zalecana dawka: 0,25 l/ha.

3. w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji środek stosować od fazy 3 liści cebuli w dawce 0,25 l/ha i po dwóch tygodniach wykonać drugi zabieg stosując dawkę 0,25 l/ha.

- cebula z dymki.

Opryskiwać do 5 dni po posadzeniu dymki.

-Zalecana dawka: 0,5-0,75 l/ha.

Uwagi:

1. Środek można stosować w różnych fazach rozwojowych chwastów, najlepiej od wschodów do okresu gdy rośliny mają około 5-7 cm wysokości. Opryskiwać tylko suche rośliny, w dobrej kondycji, po 3-4 dniach słonecznych, w temperaturze nie wyższej niż 23°C. Środek stosowany w tym terminie powoduje zazwyczaj przemijające uszkodzenia liści, dlatego zabieg najlepiej wykonywać tak, aby możliwie jak najmniejsza ilość środka przedostała się na liście cebuli..
2. Flurofen 480 SC można stosować także w przypadku słabego działania wcześniej zastosowanych herbicydów lub w przypadku, gdy chwasty są zbyt wyrosnięte i mało wrażliwe na inne herbicydy.

3. Środek może powodować placowe odbarwienie liści cebuli z lekkim skruceniem oraz wyłożeniem szczypioru. Objawy te ustępują po około 14 dniach od zabiegu.
4. Środka nie stosować w obecności kwitnących chwastów.

- kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska), kalafior

- Zalecana dawka: 0,5-0,75 l/ha.

Opryskiwać pole przygotowane do sadzenia bezpośrednio przed sadzeniem rozsady.

Nie mieszać środka z glebą.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

RZECIWWSKAZANIA

1. Środka nie stosować:

- na rośliny mokre lub uszkodzone,
- na liście i młode pędy drzew z uwagi na możliwość uszkodzeń,

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): **NIE DOTYCZY**

OKRES KARENCJI (okres od dnia wykonania ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): **NIE DOTYCZY**

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo pod warunkiem wykonania uprzednio orki.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym można uprawiać wszystkie rośliny.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszałem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

W przypadku stosowania środka Flurofen 480 SC ze środkiem Lontrel 300 SL przygotować ciecz użytkową środka Flurofen 480 SC w połowie wymaganej ilości wody, dodać Lontrel 300 SL i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

Nosić odpowiednią odzież ochronną.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (058) 349-28-31

Kraków – (012) 411-99-99

Lublin – (081) 740-89-83

Łódź – (042) 657 99-00

Poznań – (061) 847-69-46

Rzeszów – (017) 866-40-25

Sosnowiec – (032) 266-11-45

Tarnów – (0-14) 631-51-77

Warszawa – (022) 619-66-54

Wrocław – (071) 343-30-08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -