

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 681/2017d z dnia 20.12.2017 r.
zmieniającej zezwolenia MRiRW nr R - 13/2017 wu z dnia 13.03.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:

Kreglinger Europe n.v., Grote Markt, 7, B - 2000 Antwerpia, Królestwo Belgii, tel.: +32 (0)3 22 22 050, fax: +32 (0)3 22 22 045, e-mail: info@kreglinger.com

ITCAN 270 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

hydrazyd maleinowy (substancja z grupy hydrazydów) – 270 g/l (22.68%)

w postaci soli potasowej – 360 g/l (30,24%)

**Zezwolenie MRiRW nr R - 13/2017 wu z dnia 13.03.2017 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 681/2017d z dnia 20.12.2017 r.**

EUH401	W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P391	Zebrać wyciek

OPIS DZIAŁANIA

REGULATOR WZROSTU o działaniu układowym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Ziemniak

Zapobieganie kiełkowaniu bulw podczas przechowywania

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 11,0 l/ ha.

Termin stosowania: Opryskiwać plantację ziemniaka na 3-7 tygodni przed zastosowaniem desykacji lub na początku naturalnego więdnienia naci ziemniaczanej (od BBCH 91).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 300 - 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie. średniokropliste.

Cebula

Zapobieganie wyrastaniu podczas przechowywania

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,9 l/ ha

Termin stosowania: Opryskiwać plantację nie wcześniej niż gdy 10%, ale nie później niż gdy 50% roślin ma wyschniętą szyjkę i załamany szczytopior, tj. około 10-15 dni przed zbiorem (od BBCH 47-48).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 500 - 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie. średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH

**Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik**

Szalotka, czosnek

Zapobieganie wyrastaniu podczas przechowywania

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,9 l/ ha

Termin stosowania: Opryskiwać plantację nie wcześniej niż gdy 10%, ale nie później niż gdy 50% roślin ma wyschniętą szyjkę i załamany szczyt, tj. około 10-15 dni przed zbiorem (od BBCH 47-48).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 500 - 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie. średniokropliste.

Tytoń

Usuwanie pędów bocznych

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,3 l/ ha

Termin stosowania: Opryskiwać plantacje tytoniu kiedy 30% - 60% liści przewidzianych do zbioru jest dojrzałych (BBCH 43-46). Podczas aplikacji środka ostatnie liście przeznaczone do zbioru powinny osiągnąć około 15-20 cm długości.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 500 - 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie. średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Ziemniak - 21 dni.

Cebula, szalotka, czosnek - 4 dni.

Tytoń – nie dotyczy.

1. Środek stosować na roślinach zdrowych, w dobrej kondycji.
2. Zwrócić uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową opryskiwanych roślin.
3. Środka nie stosować:
 - w temperaturze powietrza powyżej 25°C oraz wilgotności względnej powietrza powyżej 50%,
 - na 24 godziny przed spodziewanym deszczem,
 - na plantacjach ziemniaka nasienne i sadzeniaka oraz w cebuli przeznaczonej do uprawy z dymki,
 - łącznie z innymi regulatorami wzrostu i rozwoju roślin.
4. W przypadku stosowania na plantacjach roślin cebulowych zaleca się dodanie do zbiornika opryskiwacza preparatu zwilżającego, zmniejszającego napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej.

5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaściu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej należy:

- jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHEWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich
- w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradzić się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skórą: natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Płukać natychmiast dużą ilością wody przez 15 min / wziąć prysznic. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku zanieczyszczenia oczu: natychmiastowe i dłuższe płukanie w wodzie trzymając powieki szeroko rozwarte (przynajmniej przez 15 minut). Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymującego się podrażnienia, zasięgnąć porady okulisty.

W przypadku połknięcia: skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub z lekarzem.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -