

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 269/2018d z dnia 11.06.2018 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 135/2014 z dnia 20.08.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:

Scotts Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, tel.: 22 465 61 80, fax:
22 465 61 91, e-mail: infopl@scotts.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:

TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa,
tel.: 58 676 7489, fax: 58 678 71 93, e-mail: info@target.com.pl

LANDSCAPER PRO WEED CONTROL + FERTILIZER

Środek ochrony roślin przeznaczony do zastosowań profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – **8,0 g/kg (0,8%),**

dikamba (związek grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – **1,2 g/kg (0,12%).**

Zawartość składników nawozowych:

azot ogólny- **22,0%;**

fosfor (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie – **4,3%;**

potas (K_2O) rozpuszczalny w wodzie – **5,0%.**

**Zezwolenie MRiRW nr R- 135/2014 z dnia 20.08.2014 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 269/2018d z dnia 11.06.2018 r.**

EUH208 - Zawiera 2,4-D. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH 401- W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA

Landscaper Pro Weed control + Fertilizer jest środkiem chwastobójczym w formie mikro granul do stosowania na trawnikach i murawach na terenach rekreacyjnych oraz na boiskach sportowych i polach golfowych.

Środek stosowany nalistnie, przeznaczony do:

- pielęgnacji trawników dostarczając im niezbędnych środków odżywczych zapewniających intensywny wzrost oraz wybarwienie trawy,
- zwalczania wielu chwastów dwuliściennych dzięki obecności dwóch selektywnych substancji czynnych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów powodując ich deformację oraz zahamowanie wzrostu.

Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Chwasty wrażliwe: babka zwyczajna, babka lancetowata, jaskier rozłogowy, koniczyna biała, mniszek pospolity, stokrotka pospolita, lucerna nerkowata, krwawnik pospolity.

STOSOWANIE ŚRODKA

TRAWNIKI, MURAWY

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m² lub 200 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m² lub 200 kg/ha.

Gdzie stosować:

Na wszelkie trawniki i murawy na terenach rekreacyjnych (m.in. parki, ogrody wypoczynkowe) oraz na trawiastych boiskach sportowych i polach golfowych.

Termin stosowania:

Środek stosować w czasie okresu wegetacji, na wolnym powietrzu, od marca do połowy lipca.

Łącznie dopuszcza się maksymalnie 1 zastosowanie na uprawę i okres wegetacji, przy czym niedopuszczalne jest stosowanie środka wraz z dodatkowymi środkami, zawierającymi tę samą substancję czynną (te same substancje czynne).

SPOSÓB STOSOWANIA

Preparat równomiernie rozprowadzić na przewidzianą powierzchnię unikając nakładania się dawki lub pomijania terenu, używając prawidłowo skalibrowanego siewnika do nawozów.

Jeżeli 2 dni po zastosowaniu środka nie wystąpią opady deszczu, trawnik intensywnie podleć wodą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Środek stosować podczas spokojnej pogody, gdy gleba jest możliwie wilgotna, a trawnik suchy, gdy występują aktywnie rosnące chwasty.

Najlepsze rezultaty osiąga się po wiosennym lub wczesno letnim zastosowaniu.

Nie kosić trawnika co najmniej 3 dni przed zastosowaniem oraz 4 dni po zastosowaniu środka.

Środka nie stosować:

- przed spodziewanymi przymrozkami i w warunkach mroźnej pogody,
- w warunkach suszy, gdy trawnik narażony jest na stres,
- na trawniki, murawy 6 miesięcy od założenia oraz w roku, w którym dokonano wysiewu.

Przez okres 8 tygodni od zastosowania środka nie dosiewać trawy w miejscach wymagających uzupełnienia.

Po zastosowaniu środka, pierwszych czterech pokosów trawy nie przenosić do kompostowni, chyba, że trawa kompostowana będzie co najmniej 6 miesięcy.

Środek może być stosowany wokół drzew na trawniku, ale należy unikać kontaktu środka z ulistnieniem drzew.

Środek może być stosowany, gdy na trawniku rosną rośliny ozdobne cebulowe, pod warunkiem że ich części nadziemne naturalnie obumarły.

Unikać znoszenia środka na rabaty roślin ozdobnych i inne rośliny sąsiadujące z terenem przeznaczonym do stosowania.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Po stosowaniu środka dokładnie umyć ręce.

W przypadku połknięcia środka natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Na obszar potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Po zastosowaniu środka, trawą z trzech pierwszych pokosów nie karmić zwierząt.

Trawą, na którą zastosowano środek nie karmić zwierząt gospodarskich.

Nie karmić zwierząt plonami/produktami z przemiału, pochodzącymi z roku (sezonu), w którym zastosowano środek.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w bezpiecznym, chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu z dala od nasion, innych roślin i nawozów.

Przechowywać w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 18 miesięcy

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -