

Posiadacz zezwolenia:

Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska; tel.: +33 472 854 947, fax: +33 472 854 936

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 35 00, fax: 22 572 36 03.

## PONCHO EXPERT

### Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

chlotianidyna (związek z grupy neonikotynoidów) - 150 g/l (12,40%),  
imidachlopyryd (związek z grupy neonikotynoidów) - 375 g/l (30,99%).

**Zezwolenie MRiRW nr R- 248/2017 z dnia 22.11.2017 r.**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Uwaga</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| H302<br>H410                                                                      | Dział szkodliwie po połknięciu.<br>Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.                                                                                                                                                                      |
| EUH208<br>EUH401                                                                  | Zawiera benzisotiazol-3(2H)-on oraz 3(2H)-isotiazolon, 5-chloro-2-methyl-, mieszaninę z 2-methyl-3(2H)-isotiazolonem. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.<br>W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. |
| P280<br>P301+P312<br>P391                                                         | Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.<br>W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.<br>Zebrać wyciek.                                                                                                          |

### OPIS DZIAŁANIA

Insektycyd w formie płynnego koncentratu, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do stosowania przy użyciu profesjonalnego sprzętu do otoczkowania nasion buraka cukrowego przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin. W roślinie działa układowo.

### STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu profesjonalnego sprzętu do otoczkowania.

#### Burak cukrowy

*drobnica burakowa, drutowce, śmietka ćwiklanka, mszyca trzmielinowo-burakowa.*

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 66,6 ml na 1 jednostkę siewną (100 tys. nasion)

Liczba zabiegów: 1

*mszyce wektory chorób wirusowych*

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 133,3 ml na 1 jednostkę siewną (100 tys. nasion)

Liczba zabiegów: 1

Maksymalna liczba zabiegów na daną partię nasion: 1

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA**

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Środek przeznaczony jest do zaprawiania nasion buraka cukrowego przez profesjonalne podmioty, spełniające wymagania ESTA.

Zaprawiać nasiona zgodnie z technologią firmy Bayer.

Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

Zaprawione nasiona używać wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać ich na paszę i na cele konsumpcyjne.

Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny, o wysokiej energii kiełkowania i odpowiedniej wilgotności.

Nie stosować do zaprawiania rodów hodowlanych.

Zaprawione nasiona po dosuszeniu przechowywać w grubych papierowych lub foliowych, oznakowanych, szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Nie przechowywać razem z żywnością i paszą.

W przypadku przechowywania zaprawionych nasion, przed siewem sprawdzić ich siłę kiełkowania.

Maksymalna norma wysiewu dla nasion buraka cukrowego zaprawionego środkiem wynosi 1,3 jednostki siewnej na 1 ha (1 jednostka siewna = 100 tys. nasion).

Na opakowaniach zaprawionych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty:

- siew wykonać za pomocą siewników wykluczających możliwość wzbijania się pyłu w chwili dokonywania wysiewu nasion do gleby i przy napełnianiu zasobników siewnika,
- nie stosować siewników pneumatycznych, z wyjątkiem siewników wyposażonych w dyfuzory, których końcówki należy skierować jak najbliżej powierzchni gleby, mocując na ich wylocie elastyczną rurę lub odpowiedniej długości przewód elastyczny kończący swój wylot tuż przy powierzchni gleby,
- nie dopuszczać do uszkodzenia powłoki nasion w trakcie ich przechowywania, transportu i siewu,
- w celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione nasiona są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,
- zebrać przypadkowo rozsypane nasiona,
- w przypadku przechowywania zaprawionych nasion, przed siewem sprawdzić ich siłę kiełkowania, zaprawione nasiona używać wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać ich na paszę i na cele konsumpcyjne.

Środek zawiera dwie substancje czynne: chotianidyna i imidachlopyryd, które należą grupy neonikotynoidów, związków które są anatognistami receptorów nikotynowych acetylocholino (wg IRAC grupa 4A).

## **TECHNIKA ZAPRAWIANIA**

Zaprawiać nasiona wyłącznie przy użyciu profesjonalnego sprzętu do otoczkowania nasion buraka cukrowego. Zabieg zaprawiania powinien zostać wykonany w sposób wykluczający możliwość wzbijania się pyłu podczas przechowywania, transportu. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

## **POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI ZAWIESINY I MYCIE APARATURY**

Resztki zawiesiny oraz wodę użytą do mycia zaprawiarki należy:

- jeżeli jest to możliwe, zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH**

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania zaprawy oraz w trakcie zaprawiania. Podczas czyszczenia sprzętu chronić dodatkowo drogi oddechowe.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):  
nie dotyczy

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO**

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

## **WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA**

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

## **PIERWSZA POMOC**

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę

W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

Okres ważności - 2 lata  
Data produkcji - .....  
Zawartość netto - .....  
Nr partii - .....