

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 549 /2016d
z dnia 25.11.2016 r. zmieniającej
zezwolenie MRiRW nr R-32 /2015wu
z dnia 11.12.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:

The Scotts Company (UK) Ltd., Salisbury House, Weyside Park, Catteshall Lane,
Godalming, Surrey, GU7 1XE, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
tel: + 44 (0) 871 220 5353, fax : + 44 (0)1483 410 220.

**Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:**

Scotts Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101 A, 04-041 Warszawa, tel.: 22 465 61 80,
fax: 22 465 61 91, e-mail: infopl@scotts.com

**Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:**

Chemcopack, Haandorpweg 1, B-9130 Kallo, Haven 1227 - Antwerpen L.O. ,Belgia

Roundup Herbi Blok Długo Działający Ścieżki i Podjazdy

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

Glifosat – (związek z grupy aminofosfonianów) -**125g/l (12,5%)**

Diflufenikan – (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - **20g/l (2,0%)**

**Zezwolenie MRiRW Nr R-32/2015wu z dnia 11.12.2015 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 549/2016 d z dnia 25.11.2016 r.**



Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Etykieta środka ochrony roślin Roundup Herbi Blok Długo Działający Ścieżki i Podjazdy

Środek chwastobójczy przeznaczony do stosowania na powierzchniach przepuszczalnych, na których roślinność nie jest pożądana np. na drogach dojazdowych i ścieżkach, patiach, powierzchniach wzdłuż ogrodzeń, ścian i na nieużytkowanych rabatach przeznaczonych pod uprawę w ogrodach przydomowych i działkowych.

Środek zwalcza szeroką gamę chwastów dwuliściennych i jednoliściennych, w tym gatunki wieloletnie.

Środek przeznaczony do podlewania lub stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek działa kontaktowo i układowo, niszcząc części nadziemne i korzenie chwastów, oraz zabezpiecza przed ich odrastaniem. Środek zawiera dwie substancje czynne, o różnym mechanizmie działania, w tym substancję czynną tworzącą barierę w górnej warstwie gleby, który daje długotrwałe działanie, zapobiega pojawianiu się chwastów do 3 miesięcy.

Jedna aplikacja niszczy większość chwastów występujących wokół domów i w ogrodach przydomowych.

Chwasty wrażliwe: babka lancetowata, bodziszek porożcinany, gwiazdnica pospolita, kłosówka wełnista, mleczeń polny, lucerna nerkowata, ostrożeń polny, przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, wiechlina roczna.

Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, konieczyna biała, mniszek pospolity, palusznik krwawy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Ścieżki, drogi dojazdowe, patia, powierzchnie wzdłuż ścian, ogrodzeń (tylko podłoża przepuszczalne takie jak żwir czy piasek).

Nieużytkowane rabaty przeznaczone pod uprawę.

Stosowanie punktowe, wokół drzew i krzewów ozdobnych.

Uwaga:

Środka nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 9 ml/10 m²

Termin stosowania:

Profilaktycznie środek można stosować już w marcu lub później, w suche i bezwietrzne dni, gdy chwasty są we wczesnych fazach rozwojowych i aktywnie rosną.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody:

- 0,5 l /10 m² opryskiwanie,

- 2,5 l /10 m² podlewanie

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA

Nie stosować, jeśli spodziewany jest deszcz w ciągu 6 godzin od zastosowania.

Unikać opryskiwania na terenach podmokłych.

Na powierzchniach naturalnych stosować tylko w miejscach gdzie roślinność jest niepożądana.

W celu uzyskania maksymalnego zabezpieczenia powierzchni, nie należy uprawiać gleby lub podłoża oraz przekopywać przynajmniej przez 6 godzin od zastosowania.

W celu uniknięcia przeniesienia środka na obszary uprawiane, nasadzenia roślin ozdobnych, trawniki itp. nie należy opryskiwać w wietrzne dni oraz nie należy chodzić po opryskanej powierzchni do momentu, kiedy powierzchnia nie wyschnie.

Nie stosować na powierzchniach zajętych pod uprawę.

Nie stosować na trawnikach, chyba że mają ulec zniszczeniu.

Jeśli powierzchnia ma być uprawiana to powinno upłynąć co najmniej 6 miesięcy pomiędzy zabiegiem a nasadzeniami lub wysiewem. Ponadto gleba powinna być starannie przekopana, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia kolejnych roślin. W przypadku wieloletniego stosowania środka lub innych środków zawierających substancję czynną diflufenikan przekopanie powierzchni może być niewystarczające by uniknąć uszkodzenia kolejnych nasadzeń czy zasiewów.

Środek można również stosować wokół drzew i krzewów ozdobnych (zarówno liściastych jak i iglastych) i innych dużych roślin ozdobnych. W takich przypadku stosować uważnie upewniając się, że produkt nie styka się z liśćmi i innymi częściami nadziemnymi rośliny ozdobnej, w tym z pniem czy gałęziami.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I SPOSÓB STOSOWANIA

1. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
2. Wstrząsnąć pojemnik.
3. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika napelnionego częściowo wodą po czym uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
4. Aplikować za pomocą opryskiwacza lub poprzez podlewanie.
5. Sprawdzić czy środek naniesiono równomiernie na rosnące chwasty i zachwaszczoną powierzchnię.
6. Na obszarze gęsto zarośniętym należy sprawdzić czy środek dotarł do powierzchni gleby, co powinno zapobiec kiełkowaniu chwastów.
7. Zalecane stężenia środka: - podlewanie 18 ml na 5 litrów wody, opryskiwanie 18 ml na 1 litr wody na 20 m².
8. Jeśli jest to możliwe należy oznaczyć obszar zabiegu.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Etykieta środka ochrony roślin Roundup Herbi Blok Długo Działający Ścieżki i Podjazdy

Stosować rękawice ochronne (nitrylowe).

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku rozlania wytrzeć powierzchnię.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie stosować w pobliżu stawów i wód powierzchniowych.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Chronić dzieci i zwierzęta przed kontaktem z opryskaną rośliną lub powierzchnią do chwili, kiedy roztwór wyschnie.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następnie:

6 miesięcy, wymagane jest przekopanie podłoża.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Zabezpieczyć przed przemarzaniem.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Etykieta środka ochrony roślin Roundup Herbi Blok Długo Działający Ścieżki i Podjazdy

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -