

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 560/2017d z dnia 07.11.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 212/2016 z dnia 04.11.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:

Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, tel.: 48 22 326 05 71, fax: 48 22 326 06 99, www.syngenta.pl

WAKIL XL 325 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

metalaksyl-M (związek z grupy fenyloamidów) – 175 g/kg (17,5%),

fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 50 g/kg (5%),

cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) – 100 g/kg (10%).

**Zezwolenie MRiRW nr R - 212/2016 z dnia 04.11.2016 r.
ostatnio zmienione decyzją R - 560/2017d z dnia 07.11.2017 r.**



Uwaga

H361Df - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H373 - Może spowodować uszkodzenie narządów (wątroba, nerki, układ rozrodczy, krew, układ nerwowy) w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 – Zawiera cymoksanil. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302 + P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ – umyć dużą ilością wody z mydłem.

P309 + P311 – W przypadku złego samopoczucia – skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym i powierzchniowym, przeznaczony do zaprawiania nasion w celu zwalczania chorób

STOSOWANIE ŚRODKA

Groch uprawiany na suche nasiona

Zgorzel siewek, mączniak rzekomy grochu, askochytoza (zgorzelowa plamistość grochu), szara pleśń.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 g/ 100 kg nasion.

Groch (łuskowy w uprawie na zielone nasiona)

Zgorzel siewek, mączniak rzekomy grochu, askochytoza (zgorzelowa plamistość grochu), szara pleśń.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 g/100 kg nasion lub 40 g/100 tysięcy nasion.

Zalecana ilość wody: 230 – 580 ml/100 kg nasion.

**STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOObszarowych**

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Bobik, łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały

Zgorzel siewek (różne gatunki grzybów).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 g/100 kg nasion.

Groch zwyczajny pastewny (peluszka), soczewica, ciecierzycy

Zgorzel siewek (różne gatunki grzybów).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 g/100 kg nasion.

Zalecana ilość wody: 230 – 580 ml/100 kg nasion.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.
3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
4. Zaprawiać materiał siewny, o wysokiej energii kiełkowania i odpowiedniej wilgotności do 16%.
5. Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.

Maksymalna norma wysiewu nasion zaprawionych środkiem wynosi dla grochu 180 kg/ha, bobiku 300 kg/ha, łubinu 220 kg/ha, grochu zwyczajnego pastewnego (peluszka) 180 kg/ha, soczewicy 120 kg/ha, ciecierzycy 150 kg/ha.

W celu zapobiegania powstawania odporności patogenów na substancje czynne zawarte w zaprawie należy ją stosować zgodnie z przeznaczeniem w dawce zaleconej.

Należy zaprawiać ściśle określoną ilość materiału siewnego, który zostanie na bieżąco wykorzystany do siewu. Nie zaprawiać nasion, z przeznaczeniem na przechowywanie, gdyż może to wiązać się z obniżeniem siły i energii kiełkowania.

Na opakowaniach zaprawianych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty:

1. Zaprawione nasiona mogą być użyte wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać ich na cele konsumpcyjne ani na paszę.
2. Maksymalna norma wysiewu nasion zaprawionych środkiem wynosi dla grochu 180 kg/ha, bobiku 300 kg/ha, łubinu 220 kg/ha, grochu zwyczajnego pastewnego (peluszka) 180 kg/ha, soczewicy 120 kg/ha, ciecierzycy 150 kg/ha.

3. Wysiewu zaprawionych nasion należy dokonać w odpowiednich warunkach agrotechnicznych na glebę o temperaturze i wilgotności zalecanej do siewu dla tego gatunku roślin.
4. Zaprawione nasiona przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
5. Jeśli istnieje konieczność przechowywania ziarna do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.

SPORZĄDZANIE ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA I TECHNIKA ZAPRAWIANIA

Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka.

Zawiesinę sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub oddzielnym naczyniu. Najpierw wlać odmierzoną ilość wody, następnie dodać odpowiednią ilość środka i dokładnie wymieszać.

Zaprawiony materiał siewny powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.

Zawiesinę zużyć w ciągu 24 godzin po sporządzeniu.

Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki zawiesiny oraz wodę użytą do mycia zaprawiarki należy:

- jeżeli jest to możliwe, zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania, lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania zaprawy oraz pakowania zaprawionych nasion.

Stosować ochronę dróg oddechowych (minimum półmaskę filtrującą FFP2) podczas przygotowywania zaprawy, pakowania zaprawionych nasion oraz podczas czyszczenia aparatury.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie dotyczy

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:

- zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione nasiona są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,
- zebrać przypadkowo rozsypane nasiona.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,

– w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku dostania się na skórę – umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku złego samopoczucia – skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

Okres ważności – 2 lata.

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -